

LINCOTRIMEX

Spectinomycin & Lincomycin

Injectable solution

لينكوتريمكس

لينكومايسين (هيدروكلرايد)
و اسپكتينومايسين (سولفات ترى هيدرات)
 محلول تزريري



لینکوتريمکس

(محلول استریل تزریقی)

شرایط نگهداری:
زیر ۳۰ درجه سلسیوس

اعتبار مصرف پس از اولین استفاده: ۲۸ روز

تداخل دارویی:
همزمان با آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوژیدی و ماکرولیدها مصرف نشود.

احتیاطات برای افراد تزریق کننده:

- در صورت حساسیت به این دارو با آن کار نکنید.
- در صورت تماس با چشم یا پوست موضع را با آب فراوان بشویید.
- در صورت تزریق اتفاقی به خود یا بروز نشانه هایی مثل تورم در صورت، لب ها یا چشمها و یا بروز مشکل تنفسی فوراً به پزشک مراجعه کنید و برگه دارو را نشان دهید.
- در موقع تزریق دارو از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری کنید.

تولیدکننده:
کمپانی سوپرز دایانا - اسپانیا

نماینده انحصاری و واردکننده:
شرکت داروسازی رویان دارو

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ۵۰ میلی گرم لینکومایسین (هیدروکلراید) و ۱۰۰ میلی گرم اسپکتینومایسین (سولفات تری هیدرات)

موارد مصرف:

درمان عفونت های ناشی از میکرو ارگانیسم های حساس به ترکیب لینکومایسین و اسپکتینومایسین شامل:

گاو: کلی باسیلوز

گوسفند: کلی باسیلوز، مایکوپلاسموز، ذات الایه ناشی از انواع پاستورالها

سگ: کلی باسیلوز - ذات الایه ناشی از کلبسیلا پنومونیه، انواع پاستورالا، مایکوپلاسمما، بوردتلا برونشی سپتیکا

حیوان هدف:

گاو، گوسفند و سگ

مقدار و نحوه مصرف:

در گاو، گوسفند و سگ: ۱۵-۵۰ میلی گرم اسپکتینومایسین و ۵-۱۵ میلی گرم لینکومایسین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن (معادل ۱-۲ میلی لیتر از این دارو به ازاء هر ۱۵ کیلوگرم وزن بدن) بوسیله تزریق عضلانی هر ۱۲ ساعت به مدت ۴-۷ روز متوالی

موارد منع مصرف:

در حیوانات دارای آلرژی نسبت به لینکومایسین و اسپکتینومایسین مصرف نشود.

در اسب مصرف نشود. (صرف لینکومایسین در اسب ممکن است باعث کولیت هموراژیک یا اسهال شدید گردد).

در دوره آبستنی و شیرواری مصرف نشود.

عوارض جانبی:

ممکنست در محل تزریق عضلانی تحریک موضعی و درد بروز کند.

دوره پرهیز از مصرف گشت: ۱۴ روز



نماینده انحصاری در ایران:
شرکت داروسازی رویان دارو
تلفن: ۰۳۳-۴۸۷۴۹۳۹
www.rooyandarou.com



SUPER'S DIANA, S.L.

شرکت سازنده:

شرکت داروسازی سوپرز دایانا اسپانیا