

# سایرو اکس

حشره کش موثر علیه لارو مگس در کود و بستر

**DESINTEC®**



**CyroEx®**

**CyroEx**

**Insecticide**

against fly larvae in  
manure and litter.



**12 kg**

# CyroEx

Insecticide against fly larvae in manure and litter. حشره کش موثر علیه لارو مگس در کود و بستر

## ساپرولکس

حل شود و روی ۱۰ متر مربع کود آب پاشی شود.

اسپری کردن: ۲۵۰ گرم سایرو اکس در ۱ تا ۴ لیتر آب ولرم حل

شده و روی ۱۰ متر مربع کود اسپری شود.

ساپرولکس یک مهارکننده رشد با اثر انتخابی روی لارو مگس، سمپاشی روی کود را ۱۵ روز بعد تکرار کنید. در نهایت ۱۵ روز بعد برای بار سوم سمپاشی کنید.

**ترکیب:**

ساپرولکس ۲٪

**خصوصیات:**

هدیج مقاومت یا مقاومت شناخته شده ای علیه آن تا امروز دیده نشده است.

**موارد احتیاط:** هدیج مقاومت یا مقاومت شناخته شده ای علیه آن تا امروز دیده نشده است.

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- از آنجایی که فاقد اثر منفی بر پستانداران می باشد، می تواند در حضور دام نیز استفاده شود.

ساپرولکس به عنوان یک شبه تنظیم کننده رشد عمل می کند کشیدن خودداری شود و از ماسک، عینک محافظ و دستکش و مرحله پوست اندازی در لارو مگس را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده شود.

- از بین رفتن جمعیت مگس بالغ بتدریج رخ می دهد و یک تا دو هفتاه بعد از سمپاشی مشاهده می گردد زیرا روی مگس بالغ به صورت در بسته نگهداری شود.

موثر نمی باشد. تنها روی کود یا سایر مکان های تخمریزی مگس از آسودگی آبخوری ها، دانخوری ها و آخورهای خوراک با این محصول جلوگیری شود.

ساپرولکس گرانول قابل حل در آب مناسب برای پاشیدن به یخوبی تهويه می شود، دور از دسترس کودکان و حیوانات نگهداری شود.

بعد از استفاده، قسمت هایی از بدن که در معرض سم قرار گرفته شسته شده و لباس ها تعویض گردد.

**ظرف خالی:** بسته بندی خالی را مطابق مقررات محلی از بین ببرید. بسته محصول نباید در هیچ شرایطی برای سایر مانع از ظرف خالی آن محل های جریان آب، حوضچه ها یا استخرها را مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. اجازه ندهید این محصول یا

گاوداری ها: بسته عمیق: لبه ها و مناطق نشتی کنار آخورها و آبشخورها و آبخوری ها و جایی که کود تجمع پیدا می کند سمپاشی شود. در گوساله دانی هایی که خارج از محوطه قرار گرفته اند همه سطح را سمپاشی کنید.

**روش استفاده:** سایر مانع از تجمع کود را تقریباً ۳ روز بعد از کودکشی از طریق خیساندن یا اسپری کردن به کار ببرید و بعد از هر بار کودروبی یا هر زمان که لارو مگس پیدا شد، سمپاشی را تکرار کنید.

**کف مشبك و ناهموار:** همه محوطه کف را بعد از پاکسازی کود سمپاشی کنید، بعد از هر بار پاکسازی یا مشاهده لارو سمپاشی را تکرار کنید.

**مرغداری ها:**

ساپرولکس را تقریباً یک هفته پس از تخلیه کود از طریق خیساندن یا اسپری کردن روی تمام محوطه حاوی کود به کار ببرید.

بعد از هر بار تخلیه کود یا مشاهده لارو مگس سمپاشی را تکرار کنید.

**ساپرولکس واحدا:**

ساپرولکس را در محل های تخمریزی مگس به کار ببرید. سمپاشی دوم دو هفته بعد تکرار شود.

**مقدار مصرف:**

**پاشیدن خشک:** ۲۵۰ گرم سایرولکس روی ۱۰ متر مربع کود پاشیده شود.

**آپیاشی کردن:** ۲۵۰ گرم سایرولکس روی در ۱۰ لیتر آب ولرم