

CALCIFOSTIL

Gel (oral)

کلسیل ماگ

محلول (ژل) خوراکی

توصیه می شود که یک بطری از محلول طبق دستور زیر ۳ مرتبه خورنده شود:
یک بطری ۱۲ ساعت قبل از زایمان، یک بطری بلافاصله بعد از زایمان و یک بطری ۱۲ ساعت بعد از زایمان.

در گاوهای شکم دو و بالاتر که به تب شیر حساس تر هستند تجویز دارو به صورتی که در ذیل آمده است توصیه می شود:

یک بطری ۲۴ ساعت قبل از زایمان، یک بطری ۶-۱۰ ساعت قبل از زایمان و یک بطری بلافاصله بعد از زایمان.

در صورتی که قبلاً به گاو محلول های کلسیمی داخل رگی تزریق شده باشد توصیه می شود ۴۵۰-۵۰۰ میلی لیتر از ژل ۲ بار خورنده شود. بار اول نباید زودتر از ۶ ساعت بعد از زایمان باشد و بار دوم نیز نباید زودتر از ۶ ساعت بعد از بار اول (۱۲ ساعت بعد از تزریق داخل رگی) باشد.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
در صورت مشاهده علایم حساسیت مصرف محلول قطع گردد.

به منظور جلوگیری از بروز نئومونیای استنشاقی، محصول به گاوهایی که غیر هوشیارند یا مشکل بلع دارند، خورنده نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای بین ۱۶-۲۵ درجه سلیسیوس و در جای تاریک نگهداری شود.

از انجماد محصول جلوگیری شود.

طول عمر قفسه ای:

۲ سال بعد از تاریخ تولید درج شده روی بسته بندی

بسته بندی:

بطری پلاستیکی ۴۸۰ میلی لیتری

تولید شرکت: RUVERA - لیتوانی



ترکیب: هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی:

کلرید کلسیم ۳۰ گرم (۵/۵ گرم کلسیم)
کلرید منیزیم ۵ گرم (۰/۶ گرم منیزیم)
کلرید پتاسیم ۰/۵ گرم (۰/۲۶ گرم پتاسیم)
دی هیدروفسفات سدیم ۴ گرم (۰/۸ گرم فسفر)

خصوصیات:

با اثر سریع میزان کلسیم سرم خون را به حالت طبیعی در می آورد.

جذب سریع از دستگاه گوارش دارد.

منیزیم و پتاسیم موجود در محصول اثر منفی کلسیم روی قلب را کاهش می دهد.

با داشتن مکمل فسفری باعث رفع علایم کمبود فسفر می گردد.

به خاطر ماهیت ژلی، باعث تحریک و آزار مخاط دستگاه گوارش نمی شود.

به خاطر شکل خاص بطری، به راحتی قابل استفاده است.

حیوان هدف: گاو

موارد استفاده:

این ژل برای استفاده در گاوها به منظور پیشگیری از فلج بعد از زایمان در هنگام زایمان و بعد از آن توصیه شده است.

این ژل می تواند به عنوان افزودنی به غذا در موارد کمبود کلسیم استفاده شود.

میزان و نحوه مصرف:

قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.