

کلسیل ماگ

محلول (ژل) خوراکی

CALCIL MAG

Gel (oral)



در صورتی که قبلاً به گاو محلول های کلسیمی داخل رگی تزریق شده باشد توصیه می شود زایمان باشد و بار دوم نیز نباید زودتر از ۶ ساعت بعد از بار اول (۱۲ ساعت بعد از تزریق داخل رگی) باشد.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت مشاهده علائم حساسیت مصرف محلول قطع گردد.

به منظور جلوگیری از بروز نومونیای استنشاقی محصول به گواهایی که غیر هوشیارند یا مشکل بلع دارند، خوراند نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای بین ۱۶-۲۵ درجه سلسیوس و در جای تاریک نگهداری شود. از انجماد محصول جلوگیری شود.

طول عمر قفسه ای:

۲ سال بعد از تاریخ تولید درج شده روی بسته بندی

بسته بندی:

بطری پلاستیکی ۴۸۰ میلی لیتری
تولید شرکت: RUVERA - لیتوانی

تربیب: هر ۱۰۰ میلی لیتر حاوی:

کلرید کلسیم ۵۷ گرم (۱۰/۱۴ گرم کلسیم)

کلرید منیزیم ۶/۲ گرم (۰/۷۳ گرم منیزیم)

کلرید پتاسیم ۰/۵۲ گرم (۰/۳۷ گرم پتاسیم)

خصوصیات:

با اثر سریع میزان کلسیم سرم خون را به حالت طبیعی در می آورد.

جذب سریع از دستگاه گوارش دارد.

منیزیم و پتاسیم موجود در محصول اثر منفی کلسیم روی قلب را کاهش می دهد.

به خاطر ماهیت ژلی، باعث تحریک و آزار مخاط دستگاه گوارش نمی شود.

به خاطر شکل خاص بطری، به راحتی قابل استفاده است.

حیوان هدف:

موارد استفاده:

این ژل برای استفاده در گاوها به منظور پیشگیری از فلچ بعد از زایمان در هنگام زایمان و بعد از آن توصیه شده است.

این ژل می تواند به عنوان افزودنی به خوراک در موارد کمبود کلسیم استفاده شود.

میزان و نحوه مصرف:

قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.

توصیه می شود که یک بطری از محلول طبق دستور زیر ۳ مرتبه خوراند شود:

یک بطری ۱۲ ساعت قبل از زایمان، یک بطری بلا فاصله بعد از زایمان و یک بطری ۱۲ ساعت بعد از زایمان.

در گاوها شکم دو و بالاتر که به تب شیر حساس تر هستند تجویز دارو به صورتی که در ذیل آمده است توصیه می شود:

یک بطری ۲۴ ساعت قبل از زایمان، یک بطری ۶-۱۵ ساعت قبل از زایمان و یک بطری بلا فاصله بعد از زایمان.



RUVERA UAB

