

آلزانه

محلول تزریقی برای سگ و گربه

Alzane

Solution for injection for dogs and cats



بر سیستم عصبی مرکزی مانند دیازپام، آسپرومازین یا مخدرا توصیه نمی شود.

میزان و نحوه مصرف:

برای مصرف داخل عضلانی تک دوز. دوز دارو بستگی به دوز مدتومیدین تزریق شده دارد.

سگ ها: حجم آلزانه را به اندازه حجم مشابه دوربنه و ت

که قبلاً برای آرام سازی سگ داده شده است، در نظر گیرید. نمونه دوز از در سگ ها:

DORBENE (Medetomidine 1.0 mg/ml)
0.04 ml/kg body weight

ALZANE (Atipamezole hydrochloride 5.0 mg/ml)
0.04 ml/kg body weight

گربه ها: آزانه را نصف دوزی از دوربنه و ت که قبلاً برای آرام بخشی گربه تزریق شده، تجویز کنید.

نمونه دوز از در گربه ها:

DORBENE (Medetomidine 1.0 mg/ml)
0.08 ml/kg body weight

ALZANE (Atipamezole hydrochloride 5.0 mg/ml)
0.04 ml/kg body weight

زمان بهبودی در سگ ها و گربه ها تقریباً به مدت از ۵ دقیقه کاهش می یابد. حیوانات تقریباً ۱۰ دقیقه بعد از تجویز مخصوص به کار می گردند.

تجویز بیش از حد (علامد، اقدامات افظاری، پاذهرها در صورت لزوم):

تجویز آتیپامازول هیدروکلر اید ممکن است تاکیارداری گذرا و هوشیاری بیش از حد (بیش فعالی، لرزش عضلانی) ایجاد کند. در صورت لزوم این علائم می تواند با تزریق مدتومیدین یا دگزدمدتومیدین با دوزی کمتر از میزان مورد نیاز برای آرام بام خشی برگردانده شود. اگر آتیپامازول هیدروکلر اید به طور اشتباہی به حیوانی که قبل از مدتومیدین دریافت نکرده تجویز شود بیش فعالی و لرزش عضلانی ممکن است رخ دهد. این اثرات ممکن است به مدت ۱۵ دقیقه ادامه داشته باشد. هوشیاری بیش از حد در گربه ها به همین حالت با کاهش حرکت های خارجی کنترل می شود.

طول عمر قفسه ای: ۲ سال.

عمر مفید پس از اولین استفاده ۲۸ روز است.

تولید کننده: شرکت سیوا - اسپانیا

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ۵ میلی گرم آتیپامازول هیدروکلر اید می باشد.

حیوان هدف:

سگ و گربه

موارد استفاده:

آتیپامازول هیدروکلر اید آنتاگوست آلفا می باشد و برای برگرداندن اثرات مدتومیدین و دگزدمدتومیدین در سگ و گربه استفاده می شود.

احتیاط های ویژه برای استفاده در حیوانات:

پس از تجویز مخصوص باید اجازه داده شود حیوانات در یک مکان آرام استراحت کنند. در طی دوره بهبودی حیوانات نباید بدون مراقبت باقی بمانند. مطمئن شوید که حیوان قبل از اینکه مرگونه غذا یا نوشیدن دریافت کند. دارای رفلکس بایع طبیعی است. اگر آرام بخش گربه به غیر از مدتومیدین یا دگزدمدتومیدین داده می شود، باید در نظر داشت که اثرات آن موافق دیگر ممکن است پس از مکوس شدن اثر آکتوپیست آلفا ۲ حفظ شوند. آتیپامازول نمی تواند اثر کاتامین را به حالت طبیعی برگرداند که اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد ممکن است باعث تشنج در سگ و گربه فکنی عضلانی در گرده ها گردد. تجویز آتیپامازول نباید زودتر از ۴۰-۵۰ دقیقه پس از تزریق کاتامین اجسام شود.

توصیه های ویژه برای افرادی که این محصول را در حیوانات تجویز می کنند:

به علت فعالیت فارماکولوژیکی قدرتمند آتیپامازول از تماس محصول با چشم، پوست و غشاءهای مخاطی خودداری نمود.

در صورت تماس اتفاقی با چشم باید پوست با آب فراوان شست و شو شود. در صورت تحریک و ایجاد التهاب با پرشک شفوت کنید. لایس های آگوو در تماس مستقیمه با پوست را بیرون آورید. در صورت مصرف خوارکی یا خود تزریقی تصادفی بالا مصلده ب پنزشک مراجده کرده و بروشور یا بر جسب دارو را نشان دهید. رانندگی نکنید. فرد بیمار را بدون مراقبت رها نکنید.

اثر جانی:

در طی ۰-۱ دقیقه اول پس از تزریق آتیپامازول هیدروکلر اید کاهش فشار خون کوتاه مدت دیده شده است.

در موارد نادر، بیش فعالی، تاکیارداری، ترشح بیش از حد براز، تولید دمای غیر معمول از حجزره، لرزش عضلانی، استفراغ، افزایش تعداد تنفس، دفع ادرار و مدفوع غیر قابل کنترل می تواند رخ دهد.

در موارد سیار نادر ممکن است عدد آرام بخشی رخ دهد یا زمان بهبودی پس از تجویز آتیپامازول کوتاهتر شود.

در زمان بهبودی پس از تجویز آتیپامازول کوتاهتر شود. اثرات مدتومیدین از یک دور کم برای برگرداندن احتمال اینتا به هیپوترمی را (حتی هنگام که این کاهش دما ناشی از آرام بخشی باشد) باید در نظر داشته باشید.

استفاده در دوران بارداری:

ایمپتی محصول در دوران بارداری و شیردهی مشخص نشده است.

بنابراین استفاده در بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

تدابع با سایر داروهای دامپزشکی:

تجویز همزمان آتیپامازول با سایر محصولات دارویی موثر

