

# بواکلوکس® دی سی اکسترا

سوپاپانسیون استریل داخل پستانی

BOVACLOX® DCXTRA

Intramammary Suspension



## ترکیب:

هر سرنگ ۵/۴ گرمی شامل:

کلوكساسيلين (نمک بنزاتین) ۶۰۰ میلی گرم

آپی سیلین (تری هیدرات) ۳۰۰ میلی گرم

## موارد مصرف:

بواکلوکس دی سی اکسترا برای استفاده در گاوها شیری در هنگام خشک کردن ساخته شده که باتفاقه شدود. بعد از آگرین شیریدوشی در دوره شیرواری استفاده می شود تا ورم پستان های موجود را درمان کرده و از بروز عفونت های بیشتر در طول دوره خشکی جلوگیری نماید. بواکلوکس دی سی اکسترا داروی مناسبی برای کاهش بروز ورم پستان تابستانه در تلیسه ها و گاوها خشک در معرض خطر می باشد.

بواکلوکس دی سی اکسترا علیه ارگانیسم های گرم متبت و گرم منفی مرتبط با ورم پستان موثر می باشد و نیز علیه استرپتیوکوک آکالاتکنیه و سایر گونه های استرپتیوکوک ها، استافیلوکوک های مقاوم و حساس به پنی سیلین، گونه های کورینه باکتریوم، اشريشیاکلی و سایر باکتری های گرم منفی فعالیت دارد. کلوكساسيلين بنزاتين و آپي سيلين تري هيدرات با پايه طولاني اثر تا ده هفته غلظت موثر ضد ميكروب را در پستان گاو خشک ايجاد می کند و برای بافت پستان محرك نباشد.

## مقدار و نحوه مصرف:

### درمان خشکی:

بعد از آخرین شیریدوشی در دوره شیرواری سرپستانک ها را تمیز و ضد عفونی نموده و برای هر کارتیه محتویات یک سرنگ توک سرپستانک وارد پستان نمایید. از آلدوجن توک سرنگ خودداری شود.

### زمان پرهیز از مصرف:

شیر برای مصارف انسانی تا ۱۵۶ ساعت بعد از زایمان استفاده نشود.

در صورت زایمان گاو زودتر از ۴۹ روز بعد از تجویز پماد پستانی، توجه شود که یا بد ۴۹ روز بعلاوه ۱۵۶ ساعت از زمان تجویز پماد پستان گذشته باشد تا شیر دام مورد مصرف انسانی قرار گیرد. حیوانات نباید برای مصرف انسانی در طول دوره درمان کشتار شوند. گاو تنها روز بعد از درمان می تواند کشتار شود.

در گاوها مبتلا به هیپوکلسی ممکن است ضروری باشد که شیر برای مدت طولانی تری مصرف نشود تا زمانی که سطوح آنتی بیوتیکی به زیر حداقل سطوح آنتی بیوتیکی قابل قبول برسد که برای کلوكساسيلين ۰/۰۵۰ mcg/ml و برای آپي سيلين ۰/۰۵۰ mcg/ml می باشد.

تولیدکننده: شرکت نوربروک - ایرلند



Norbrook®  
Pharmaceuticals Worldwide

