

کلونیل®

Clonil®



سوسپانسیون خوارکی
Oral Suspension

ROOYAN
DAROU

کلوzanتل + مبندازول
Closantel + Mebendazole



فاز اول

موارد احتیاط:

قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
دارو بر اساس وزن دقیق دام و مطابق با دوز توصیه شده
صرف گردد.

دارو باید زیر نظر دکتر دامپزشک مصرف گردد.
در صورت آلوده شدن پوست و چشم به دارو می‌بایست
موقع سریعاً با آب شستشو شود.
در دوزهای درمانی سوسپانسیون کلوzanتل + مبندازول
سمی نبوده و هیچگونه اثرات جانبی را ایجاد نماید.
دارو می‌تواند برای حیوانات ابیستن و حتی در طول دوره
جفت گیری مصرف گردد.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

دور از نور و در دمای اتفاق (کمتر از ۳۰ درجه سلسیوس)
نگهداری شود.

بسته‌بندی:
ظروف ۲۵۰ میلی لیتری و ۱ لیتری

ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ۰.۵ میلی گرم کلوzanتل و ۷۵ میلی گرم
مبندازول می‌باشد.

موارد مصرف:

سوسپانسیون کلوzanتل + مبندازول می‌تواند جهت
پیشگیری و درمان بیماری‌های حاصل از موارد ذیل بکار
رود:
نماتودها و سستودهای لوله گوارش و فاسیولیازیس ناشی
از فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا زیگانتیکا

مقدار و نحوه مصرف:

بس از تکان دادن کامل بطری، سوسپانسیون کلوzanتل
+ مبندازول را با دستگاه شربت‌خواران به گوسفند و بره
بخوارانید.
۱۵ میلی گرم مبندازول و ۱۰ میلی گرم کلوzanتل به ازای
هر کیلوگرم وزن بدن گوسفند و بره توصیه می‌شود یا به
عبارت دیگر ۱ میلی لیتر سوسپانسیون به ازای هر ۵
کیلوگرم وزن بدن.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۲۸ روز از آخرین نوبت تجویز دارو

موارد منع مصرف:

جهت جلوگیری از ایجاد واکنش‌های سمی، با ترکیبات
حاوی کلراین (مثل حشره‌کش‌ها) نباید به طور همزمان
صرف گردد.