

DOXBROM®

Doxycycline

Powder for use in drinking water

داکس بروم®

داکسی سایکلین

پودر قابل حل در آب

باکتری‌های بی‌هوایی	
باکترینیدس	
کلوستربیدوم	
سایر باکتری‌ها	
مايكوبلاسما	
ريكتيريا	
كلاميديا	
ارليشيا	

موارد مصرف:
کلیباسیلوز، CRD، مايكوبلاسموز و سایر موارد
حساس به داکسی سایکلین

مقدار و نحوه مصرف:

از طریق آب آشامیدنی
در ماکیان ۵۰ میلیگرم داکسی سایکلین
خالص در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز تجویز می‌گردد. (این مقدار برابر است با ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم از محصول داکس بروم در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی در هر روز). در طی دوره درمان، پرندگان بایستی فقط از آب حاوی دارو به عنوان آب آشامیدنی استفاده نمایند.
دوز دقیق براساس وزن در ماکیان عبارت است از ۱۵-۲۰ میلیگرم داکسی سایکلین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز که معادل ۳۵-۴۰ میلیگرم محصول داکس بروم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز می‌باشد.

در صورت نیاز می‌توان از فرمول زیر برای محاسبه دقیق دوز مصرفی دارو استفاده کرد:

$$\text{مقدار داکس بروم} = \frac{۴۰ \text{ تا } ۴۵ \text{ میانگین وزن پرنده به کیلوگرم}}{\text{به کرم در هر هزار لیتر}} = \text{میانگین مصرف آب هر پرنده در روز به لیتر آب آشامیدنی}$$

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت: ۷ روز

بسته بندی:

ساخته های ۲۰۰ گرمی و یک کیلوگرمی

تولیدکننده:

شرکت داروسازی سوپر ز دایانا - اسپانیا



ترکیب:

هر ۱۰۰ گرم از این محصول حاوی:
داکسی سایکلین (هایکلیت) ۵۰ گرم
اکسپیان ۱۰۰ گرم

خواص:

- داکسی سایکلین یک آنتی بیوتیک باکتریوستاتیک می‌باشد که از سنتز پروتئین توسط باکتری‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.
- داکسی سایکلین در مقایسه با سایر آنتی بیوتیک‌های خانواده تتراسایکلین دارای مرایای ذیل می‌باشد.
- قابلیت دسترسی زیستی (Bioavailability) بیشتر متعاقب تجویز خوراکی
- توزیع و انتشار بالاتر در تمامی بافت‌ها و ترشحات بروونش‌ها
- باز جذب گستردگر در توبول‌های کلیوی
- شلاته شدن کمتر با یون‌های دو ظرفیتی و سه ظرفیتی
- ثبات و ماندگاری بیشتر در آب

طیف اثر:

باکتری‌های منفی	حساسیت متوسط (MIC90<16mg/ml)	حساسیت عالی (MIC90<4mg/ml)
کلیسیلا	هموفیلوس	
اشرشیا	کمپلیواکتر	
سامولنا	موراکسلا	
انتروباکتریا	پاستورلا	
شیگا	ویریو	
بوردلتا		
باکتری‌های گرم مثبت		
استافیلوکوکوس		
کورینه باکتریوم		
باسیلوس		
لیستریا		