



استفاده شود. برای اثر بخشی بهتر دارو، باید آب حاوی دارو، تنها منبع آب در اختیار طیور باشد.

### زمان پرهیز از مصرف:

در طیور گوشتی ۵ روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود.

در طیور تخم گذار که تخم آنها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

### تداخل دارویی:

جذب این دارو در صورت مصرف همزمان با داروهای محتوی کلسیم، منیزیم و آهن کاهش می یابد.

### عوارض جانبی:

مصرف طولانی مدت داکسی تن رویان® ممکن است باعث تغییر در فلور طبیعی دستگاه گوارش شود.

### موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

### شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین ۱۰ تا ۲۵ درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

### بسته بندی:

ظروف ۱ و ۲ لیتری

### ترکیب:

هر لیتر محلول خوراکی داکسی تن رویان® حاوی ۱۰۰ گرم داکسی سایکلین (هایکلیت) است.

### مکانیسم اثر:

داکسی تن رویان® آنتی بیوتیکی وسیع الطیف است که با اتصال به تحت واحد ۳۰S ریبوزوم میکروارگانیسم ها سنتز پروتئین را در آنها مهار و رشد باکتری را متوقف می کند (یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است). داکسی تن رویان® بر باکتری های گرم منفی از جمله گونه های پاستورلا، سالمونلا، E. Coli و گرم مثبت مانند گونه های استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، کلستریدیوم و انواع دیگری از میکروارگانیسم ها شامل مایکو پلاسماها، ریکتزیا، کلامیدیا و برخی از تک یاخته ها اثر می کند.

### موارد مصرف:

داکسی تن رویان® در درمان کلی باسیلوز، CRD ناشی از مایکوپلاسما، عفونت های مفصلی، پاستورلوز (وبای طیور)، ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیا، کوریزی عفونی ناشی از هموفیلوس، عفونت کیسه های هوایی، سالمونلوز و عفونت های استافیلوکوکی کاربرد دارد.

### مقدار و نحوه مصرف:

در طیور گوشتی ۰/۵ تا ۱ میلی لیتر از داکسی تن رویان® در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی