

# درکسین®



## ترکیبات:

محلول آبی شفاف آماده مصرف شامل ۱۰۰ میلی گرم  
 در یک میلی لیتر تولاترومایسین.

## حیوان هدف: گاو

## موارد مصرف:

در دندهاک موقتی و التهاب موضعی در محل تزریق  
 می گردد که می تواند تا ۳۵ روز ادامه یابد.  
 استفاده از این دارو باید بر اساس آزمایش های  
 حساسیت به دارو بوده و سیاست های منطقه ای  
 دولتی درمان ضد میکروبی در نظر گرفته شود.  
 مقاومت متقاطع با سایر ماکروولیدها اتفاق می افتد.  
 برای استفاده کنندگان: تولاترومایسین برای

چشم ها تحریک کننده است.  
 اگر تماس اتفاقی با چشم ها رخ داد سریعاً با آب  
 سرد شسته شود.  
 تولاترومایسین ممکن است به دنبال تماس پوستی  
 باعث حساسیت زایی شود.  
 اگر تماس اتفاقی با پوست اتفاق افتاد پوست را  
 سریعاً با آب و صابون بشویید.  
 در صورت خودتزریقی ناخواسته سریعاً کمک  
 پزشکی بخواهید  
 و برچسب یا جعبه دارو را به پزشک نشان دهید.  
 با سایر محصولات ایموونولوژیک به جز رقیق کننده  
 موجود مخلوط نکنید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**شرایط نگهداری:**  
 ظرف ۲۸ روز از باز کردن دارو آن را مصرف نمایید.  
 دور از نور و بین ۳۰-۴۵ درجه سلسیوس نگهداری  
 نمایید.  
 فریز نکنید.

**تولیدکننده:**  
 شرکت زیرپوستی غالبا منجر به واکنش های

درمان و جلوگیری از بیماری های تنفسی ناشی از  
 مانعهای (پاستورول) همولیتیکا پاستورولا مولتوسیدا.  
 هیستوفیلوس سومنی و مایکوپلاسمای بوس و  
 برای درمان عفونت قرنیه ملتجمه این گاوهای (IBK)  
 ناشی از مورکسلا بوسیس حساس به تولاترومایسین  
 استفاده می شود.

## مقدار و نحوه مصرف:

یک تزریق زیرپوستی از ۲/۵ میلی گرم تولاترومایسین  
 باز ای هر کیلوگرم وزن بدن (برابر با یک میلی لیتر  
 برای هر ۴۰ کیلوگرم وزن بدن).  
 برای درمان گاوهای بالای ۳۵۰ میلی گرم مقدار دارو  
 باید تقسیم شده و بیش از ۷/۵ میلی لیتر در یک  
 محل تزریق نگردد.  
 در حیوانات حساس به ماکروولیدها استفاده نشود.  
 دارو با سایر ماکروولیدها یا لینکوزامیدها استفاده  
 نگردد.

## دوره پرهیز از مصرف:

### گوشت و احش: ۲۳ روز

در گاوهای شیری که برای مصرف انسان شیر تولید  
 می کنند یا در گاوهای آبستن یا در تیلیسه هایی  
 که به منظور تولید شیر پرورش می یابند ظرف  
 دو ماه قبل از زیمان مصرف نشود.

## موارد احتیاط:

بعلت عدم مطالعات در رابطه با سازگاری دارو با  
 سایر محصولات دامپزشکی مخلوط نگردد.  
 تزریق زیرپوستی غالبا منجر به واکنش های