



چند قلوز ابی (PMSG) eCG را حین برداشت سیدر از بدن بز می توان تزریق نمود.
کوسفند: در فصول تولید مثل سیدر را برای ۱۲ تا ۱۴ روز داخل واژن میش قرار دهید. در غیر از فصول تولید مثل، سیدر برای ۷ تا ۱۲ روز داخل واژن قرار داده شده و علاوه بر آن تزریق (PMSG) eCG حین برداشت سیدر از داخل واژن تومیمه می شود.

تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی بايستی ۴۰ تا ۴۸ ساعت پس از برداشت سیدر در بز ماده و ۵۰ تا ۵۴ ساعت پس از برداشت سیدر در بیش ها انجام شود. در جفت گیری طبیعی نسبت نرها بايستی حداقل یک هدیه باشد.

کارگذاری:

رونون ذیل در کارگذاری بايستی رعایت شود:
۱- قبل از استفاده از اپلیکاتور، آنرا با یک محلول ضدعفونی کننده غیرمحرك ضد عفونی کرده و انتهای اپلیکاتور را با یک لوبریکانت مخصوص دامپزشکی آغشته نمایید.



۲- سیدر را بر روی اپلیکاتور بارگذاری نمایید. شاخه های سیدر باید اندکی از انتهای اپلیکاتور بیرون زده باشد (شکل ۱). (قسمتی که بارگذاری سیدر انجام شده است) را با مقدار اندکی لوبریکانت آغشته کنید.

۳- دم را بلند کرده و قسمت خارجی واژن و مقعد را تمیز نمایید.



۴- به آرامی اپلیکاتور را وارد واژن نمایید، ابتدا به صورت عمودی و سپس افقی تا جایی که جهت ورود بیشتر وجود یک مانع حس گردد (شکل ۲ و ۳).

ترکیبات: Eazi Breed CIDR صورت T شکل بوده و هر واحد آن دارای یک لایه سیلیکونی (ضخامت یک میلیمتر) حاوی ۵/۳۳ گرم پروژسترون طبیعی میکرونبیزه (که بطرور یکنواخت روی سیلیکون پخش شده است) می باشد که بر روی یک ساختار نایلوپی با دنباله ای پلی استری تعییه شده است.

خصوصیات فارماکولوژیک:

خصوصیات فارماکودینامیک: سیدر در تمام مدتی که داخل واژن و در تماس با مخاطرات واژن می باشد پروژسترون را به تدریج آزاد کرده و سطح خونی آن را در حد مشخص نگه می دارد. به این ترتیب آزادسازی GNRH LH سرکوب شده و از بلوغ فولیکول جلوگیری شده و چرخه فحلی تحت کنترل قرار می گیرد. پس از برداشت سیدر، میزان پروژسترون خون سریعاً افت پیدا کرده و به دنبال آن یک سیکل فحلی جدید و اولواسبیون اتفاق می افتد.

خصوصیات فارماکوکینتیک:

بعد از کارگذاری سیدر داخل واژن، حد اکثر غلاظت پلاسمایی پروژسترون (Cmax) ۴/۳۳ ng/ml در طی ۱/۱۹ ساعت (Tmax) به دست خواهد آمد. سطح زیر نمودار (AUC) ۱۹/۴۷ ng/ml عمر (t1/2) ۲/۹۸ ساعت می باشد. نیمه سیدر، میزان پروژسترون در عرض ۶ ساعت کاهش خواهد یافت.

موارد مصرف:

با استفاده از سیدر داخل واژنی کنترل سیکل فحلی و تولید مثل در فصول غیرتولید مثلی امکان پذیر خواهد شد.
- همزمانی فحلی در تعداد زیادی از حیوانات گله - امکان بر زایی های متعدد در یک بازه زمانی مشخص - کمک به برنامه های انتقال جنین

دستور العمل مصرف:

فقط به شکل داخل واژنی مصرف شود. هر سیدر یکبار مصرف بوده و برطبق برنامه های پیشنهادی در داخل واژن باقی ماند. عموماً یک تا سه روز پس از برداشت سیدر فحلی بروز می نماید.

برنامه های پیشنهادی:

بزها: به مدت ۱۷ تا ۱۹ روز سیدر داخل واژن بز ماده قرار می گیرد. جهت اجرا همزمانی فحلی بهتر و نیز

موارد عدم مصرف:

در موارد زیر نباید از سیدر استفاده کرد: در بزها و گوسفندانی که دستگاه تناسلی آنها به بلوغ نرسیده یا دچار عفونت شده است، نباید مصرف شود.
استفاده حین آبستنی: پروژسترون نقش مهمی در ادامه آبستنی دارد. تجویز سیدر داخل واژنی در حیوانات آبستن آثر منفی بر آبستن ندارد.
در حیوانات شیوروار بدون هیچ شکل قابل استفاده است.

احتیاطات عمومی:

قبل از استفاده بروشور دارو را مطالعه نمایید. در موادی که با واکنش‌های ناخواسته مواجه شدید، با دامپیشک خود تماس بگیرید. از دسترس کودکان به دور نگهداشتند شود.

احتیاطات مربوط به کاربر:

همیشه حین کار با سیدر (کارگذاری و برداشت) از دستکش پلاستیکی استفاده نمایید. چنانچه پوست یا دست شما با سیدر تماس حاصل نمود، با آب و صابون شسته شود. حین کار با سیدر از خوردن و آشامیدن یا استعمال دخانیات پرهیز نمایید.

احتیاطات مربوط به نگهداری:

تاریخ انقضا محصول ۲ سال پس از زمان تولید آن می‌باشد. در حرارت ۱۵ تا ۲۵ درجه سلسیوس شود.

احتیاطات مربوط به دفع این محصول و محصولات مشابه:

سیدر و محصولات مشابه آن پس از مصرف یا مقادیری از دارو که مورد مصرف واقع نشده‌اند، باقیستی به نحوی دفع شوند تا محیط زیست را آلوود ننمایند. باقیمانده‌های این محصول باقیستی به شکل مناسبی دفع شده یا در کارخانجاتی که کوره آتش دارند نابود شوند.

بسته بندی:

۴۵ عدد که در ساشه‌های پلی اتیلن حاوی زیپ قرار داده شده است.

تولیدکننده:

شرکت زوئتیس - نیوزیلند



باید به صورت آزاد قرار گیرد؛
دستی اپلیکاتور را فشار داده تا شاخه‌های

اپلیکاتور به سمت جلو حرکت نماید. بدین شکل شاخه‌های سیدر داخل واژن آزاد شده و در قسمت ابتدایی واژن قرار می‌گیرد (شکل ۴).

۷ - به مضم این که سیدر داخل واژن قرار گرفت دستی اپلیکاتور را رها نمایید و اجزا دهید تا دنباله خارجی سیدر در خارج از قسمت خارجی اندام تناسلی به صورت آیینان قرار گیرد.

۸ - قبل از استفاده از اپلیکاتور برای سایر حیوانات آن را تمیز و ضدعفونی نمایید.

عملیات برداشت سیدر:

به آرامی دنباله انتهایی سیدر را به سمت خارج بکشید. چنانچه دنباله مزبور قابل رویت نباشد، یعنی وارد قسمت انتهایی واژن شده است که با دست دارای دستکش می‌توانید آن را خارج نمایید. خارج نمودن سیدر احتیاج به نیروی زیادی ندارد. در

صورتی که مقاومتی بیشتر خارج نمودن سیدر حس شود، تومیه می‌شود تا با استفاده از انگشتانی که قبلیا با دستکش پوشیده شده‌اند، مقاومت مربوطه را مرتفع کرده و اقدام به خارج نمودن سیدر نمایید.

مالحات بالینی و احتیاطات خامن مربوط به گونه‌های هدف:

حیواناتی که براثر بیماری، تغذیه نادرست یا سایر عوامل ضعیف شده باشند، ممکن است پاسخ مناسبی به درمان با سیدر ندهند.

احتیاطات در غیر از حیوانات هدف:

نیابتی در حیواناتی به جز گوسفند و بز مورد استفاده قرار گیرد.

واکنش‌های ناخواسته:

بعضی اوقات تحریکات موضعی به همراه استفاده از سیدر مشاهده می‌شود که در بعضی موارد مرفأ ترشحات واژنی می‌باشد. این ترشحات به دنبال برداشت سیدر به مرور محو می‌شوند.

تداخل دارویی:

ندارد.

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت: ندارد. شیر: ندارد