

ENCEFAL-VAC

واکسن زنده لیوفیلیزه علیه آنسفالومیلیت طیور

۲ - مطمئن شوید که تراف آبخوری‌ها تمیز بوده و عاری از هرگونه ماده ضد عفونی کننده هستند.
۳ - مخزن حاوی واکسن را در مجاورت گرمای یا نور شدید قرار ندهید.

۴ - آب حاوی واکسن را داخل تراف‌های داخل سالان پخش نموده به نحوی که کلیه پرنده‌گان

طی ۲ الی ۳ ساعت این آب را مصرف نمایند.
بهترین زمان واکسیناسیون گله بین ماه‌های ۳ و ۴ پرورش می‌باشد؛ پرنده‌گانی که واکسن دریافت

می‌نمایند باید در سلامت عمومی برس برند.
توصیه می‌شود تا حداقل ۱۴ روز فاصله بین این واکسن و سایر واکسن‌ها لحاظ شود.
پرنده‌گان با سن کمتر از ۲ ماهگی با در جین تولید نباید واکسینه شوند؛ بنابر این واکسیناسیون باید حداقل یک ماه زودتر از شروع تخم‌گذاری انجام شود. چنانچه واکسیناسیون در سن مناسب صورت پذیرد (۳ تا ۴ ماهگی)، واکنش‌های غیرطبیعی بروز نخواهند کرد.

ایمنی قابل قبول حدود یک ماه پس از انجام واکسیناسیون ایجاد شده و تا آخر دوره تولید دواز خواهد داشت. ایمنی از طریق تخم مرغ به جوجه‌ها منتقل شده و برای چند هفته اول زندگی جوجه‌ها را حفاظت خواهد کرد.

توجه: پس از حل کردن واکسن داخل آب، باید آن را بالا فاصله مورد مصرف قرار داد. بعد از استفاده، ویل‌های خالی واکسن باید ضد عفونی شده یا سوزانده شوند.

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت ۲ تا ۸ درجه سلسیوس نگهداری شود.

عمر قفسه‌ای:

۱۸ ماه

بسته‌بندی:

ویل‌های ۱۰۰۰ دوزی

تولیدکننده:

شرکت فاترو - ایتالیا



خصمومیات واکسن:

آنفالو ۱۱۴۳ کشت ویروس آنسفالومیلیت طیور سویه Calnek ۱۱۴۳ بر روی تخم مرغ‌های نطفه دار SPF که متعاقباً لیوفیلیزه شده اند، حاصل می‌شود سویه Calnek ۱۱۴۳ که به سمت روده‌ها گرایش دارد به صورت ملایم تخفیف حدت پیدا کرده و به دلیل خاصیت ایمونوژنیک زیاد آن به طور معمول به عنوان واکسن علیه آنسفالومیلیت مورد استفاده واقع می‌شود.

ترکیب واکسن:

یک دوز واکسن حاوی حداقل 10^3 EID50 موارد مصرف:

واکسیناسیون پیشگیرانه از آنسفالومیلیت طیور در پرنده‌گانی که در سنتین بالاتر به عنوان تخم‌گذار یا مرغ مادر تولید خواهند داشت.

میزان و نحوه مصرف:

محتویات واکسن در مقادیر کمی از آب حل شده و سپس این محلول را در مقدار معین از آب موردنیاز جهت دستیابی به واکسیناسیون یکنواخت اضافه کرده و مخلوط نمایید. محلول نهایی را قبل از تجویز به گله به دقت مخلوط نمایید.

مقدار آب موردنیاز جهت دستیابی به واکسیناسیون یکنواخت با توجه به سن گله، فصل و حرارت سالان حدود ۲۰ تا ۳۰ میلی لیتر به ازای هر پرنده می‌باشد.

برای انجام یک واکسیناسیون موثر موارد احتیاطی زیر باید مدنظر باشند:
۱ - تشنجی نسبی حدود ۲ ساعت قبل از انجام واکسیناسیون به پرنده‌گان داده شود.