

اکسنل® ۱ گرمی

سفتیوفور سدیم
پودر استریل جهت محلول تزریقی

EXCENEL™ 1g

(ceftiofur sodium)

Sterile Powder



شرح دارو:

هر ویال شامل سفتیوفور می‌سدیم برابر با یک گرم سفتیوفور می‌باشد. رنگ پودر می‌تواند از سفید کرم تا قهوه‌ای مایل به زرد متغیر باشد. رنگ بر توانایی (پوتنسی) دارو تاثیری ندارد. هر میلی لیتر از محلول آماده شده حاوی ۵۰ میلی گرم سفتیوفور می‌باشد.

موارد مصرف:

اکسنل حاوی سفتیوفور می‌باشد که یک آنتی بیوتیک سفالوسپورینی باکتریسید وسیع الطیف مقاوم به بتالاکتااماز می‌باشد، که در موارد زیر مصرف می‌شود:

- درمان بیماری‌های حاد تنفسی گاوها که ناشی از مانheimia همولیتیکا، پاستورلا مولوسپیدا، اکتینوباسیلوس، هموفیلوس سومونوس یا سایر پاتوژن‌های باکتریایی مجاری تنفسی حساس به دارو می‌باشد.

- درمان گاوهای مبتلا به نکروباسیلوز حاد بین انگشتی (گندیدگی سم) که ناشی از فوزوباکتریوم نکروفروم و باکترونیدس ملائیوچنیکوس می‌باشد. مانند همه درمان‌های آنتی بیوتیک در چنین حالتی هر چه بیشتر آنتی بیوتیک در درمان با اکسنل هر چه سریعتر باید آغاز شود.

- درمان بیماری‌های تنفسی باکتریال در اسب که ناشی از استرپتوكوک ها (شامل زواپیدر-میکوس و اکوبی)، گونه‌های استافیلوکوک و یا گونه‌های پاستورلا می‌باشد.

مقدار و نحوه مصرف: آماده سازی

ویال یک گرمی - با افزودن ۲۰ میلی لیتر آب استریل به داخل ویال محلول آماده تزریق تهیه می‌شود.

برای تسهیل در آماده سازی محلول از سوزن شماره ۱۸ یا بزرگتر استفاده کنید. افزودن سریع حال ترتیبی بهتری به همراه دارد.

گاو: یک میلی گرم باز ای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با یک میلی لیتر از محلول آماده شده برای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن.

برای بیماری‌های تنفسی این میزان باید بصورت روزانه در فواصل ۲۴ ساعته به مدت سه الی پنج روز تزریق شود.

اسب: ۲ میلی گرم باز ای هر کیلوگرم وزن بدن برای با ۲ میلی لیتر از محلول آماده شده برای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن. این میزان باید روزانه به فاصله ۲۶ ساعت تزریق شود و تا ۴۸ ساعت بعد از برطرف شدن علائم کلینیکی ادامه یابد. معمولاً یک دوره درمانی ۱۰ روزه کافی می‌باشد. حداقل میزانی از دارو که در هر قسمت می‌تواند تزریق شود ۱۰ میلی لیتر است. اگر ظرف مدت ۴-۵ روز هیچ پاسخی به درمان داده نشد، تشخیص باید مجدد بررسی شود. فقط به روش داخل عضلانی استفاده شود.

تکنیک‌های معمول تزریق استریل باید به کار گرفته شود.

موارد منع مصرف و هشدارهای:

صرف اکسنل در حیواناتی که قبلاً به سفتیوفور افزايش حساسیت نشان داده اند متع شده است. در طیور بعلت خطر انتشار مقاومت باکتریایی به انسان‌ها استفاده نشود.

بعضی مواقع تزریق اکسنل باعث ناراحتی موضعی می‌شود که یک واکنش زود گذر است. تجویز داروهای ضد میکروبی در اسب‌های تحت استرس ممکن است منجر به بروز اسهال حاد شود که می‌تواند کشنده باشد. اگر اسهال حاد مشاهده شد، مصرف داروی ضد میکروبی را قطع کرده و درمان اصلاحی مناسب را آغاز کنید.

zoetis

ROOYAN
DAROU
PHARMACEUTICAL COMPANY



(ceftiofur sodium)
Sterile Powder

اکسنل® ۱ گرمی

سفتیوفور سدیم
پودر استریل جهت محلول تزریقی

شما توصیه شده که با این محصولات کار نکنید
از دست زدن به این محصول خودداری کنید.
این محصول را با دقت زیادی بکار برید تا از
در معرض قرارگیری مصون بماند و همه مواد
احتیاطی توصیه شده را بکار گیرید.

اگر شما پس از تماس با دارو دچار نشانه هایی
نظیر کهیر پوستی شدید باید با پزشک مشورت
کرده و این نشانه ها را به دکتر نشان دهید.
تورم صورت، چشم ها و لب ها یا اشکال در
تنفس علائمی بسیار جدی هستند و نیازمند
مراقبت پزشکی فوری می باشند.

بعد از استفاده دست ها را بشویید.
دور از دسترس و دید کودکان قرار دهید.
شرایط نگهداری دارو:

دور از نور نگه داشته شود.
داروی آماده نشده باید در دمای یخچال (۸-۲۰°C) درجه سلسیوس(نگهداری شود.
داروی آماده شده را می توان در دمای یخچال ۲-۸ درجه سلسیوس بمدت ۷ روز و در دمای
اتاق (زیر ۳۰ درجه سلسیوس) تا ۱۲ ساعت
نگهداری کرد.

وقتی در ویال برای اولین بار باز شد پس از
عمر مفید قابل استفاده که در بالا ذکر شد
با قیمانده باید دور ریخته شود. این تاریخ انقضا
باید روی قسمتی که روی کارتون تعییه شده
نوشته شود.

فقط برای مصرف دامپزشکی
تولیدکننده:

شرکت زوئتیس - آمریکا

استفاده از پودر استریل اکسنل ممکن است
بعثت انتشار مقاومت ضدیکروبی خطری برای
بهداشت عمومی محسوب شود. پودر استریل

اکسنل باید برای درمان در شرایط کلینیکی به
کار رود که به درمان خط اول پاسخ ضعیفی
داده اند یا انتظار می رود که پاسخ منفی دهند.
هنگام استفاده از محصول باید سیاست های
ضد میکروبی اداری، منطقه ای و ملی در نظر
گرفته شود.

افزایش استفاده که شامل مصرف دارو بجز
موارد ذکر شده می باشد ممکن است منجر به
افزایش شیوع چنین مقاومت هایی باشد.
هر زمان که امکان پذیر است پودر استریل
اکسنل باید فقط بر اساس تست حساسیت
استفاده شود.

دوره منع مصرف:

گاو: گوشت یک روز. شیر ندارد.
اسب ها: در اسب هایی که برای مصرف انسانی
در نظر گرفته شده اند استفاده نشود. اسب های
درمان شده هرگز نباید برای مصارف انسانی
کشتار شوند. اسب باید با گذرنامه ملی قانونی
اسب ها مشخص شده باشد که برای مصرف
انسانی در نظر گرفته نشده است.

هشدار برای اپراتور:

باید دقت شود تا از تزریق ناخواسته دارو به
خود جلوگیری کرد.
در صورت وقوع خود تزریقی سریعاً با پزشک
مشورت نمایید.
ممکن است پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها
متغایر تزریق، استنشاق، خوردن یا تماس
پوستی باعث واکنش های از دیاد حساسیت
شوند.

از دیاد حساسیت به پنی سیلین ها ممکن است
منجر به از دیاد حساسیت به سفالوسپورین ها
شود و بر عکس، واکنش های آگریزیک به این
مواد گاهی می تواند بسیار جدی باشد. در
صورتی که به این مواد حساسیت دارید و یا به