

انروفلوكساسيين ۱۰٪ رويان®

Enrofloxacin 10%



ROOYAN
DAROU

محلول استريل تزريري
 Injectable solution

آن دارو



پاستورلوز) و عفونت های تنفسی (برونکوپونومونی، پلوروپونومونی و عفونت های مایکوپلاسمایی) استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

برای گاو، گوسفند و بز ۲/۵ میلی گرم انروفلوكساسيين به ازاي هر کيلوگرم وزن دام به روش زير جلدی ۰/۰۵ میلی لیتر به ازاي هر ۱۰ کيلوگرم وزن زنده دام (تجویز می گردد. در موارد درگیری شدید ریوی، سالمونلوز و آگالاکسی و اگر مقدار مصرف را بایستی دو برابر نمود. دوره درمان در موارد عادی ۳ روز متواتی که در درگیری شدید تا ۵ روز توصیه می شود.

در صورت بالا بودن حجم محلول تزريري جهت جلوگیری از هرگونه واکنش جلدی، بهتر است که دارو در چند نقطه تزريري شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشتش: ۷ روز پس از آخرین تزريري دارو
ثیبیر: ۴ روز پس از آخرین تزريري دارو
موارد احتیاط:

به دلیل احتمال ایجاد ضایعات در بافت های غضروفی و مقاصل مصرف گروه فلوروکینولون ها در حیوانات در حال رشد توصیه نمی گردد.

در اسب مصرف نشود.

شرایط نگهداری:

در دمای ۱۵-۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

ترکیب:

هر میلی لیتر دارو حاوی ۱۰۰ میلی گرم انروفلوكساسيين می باشد.

مکانیسم اثر:

انروفلوكساسيين داروی باکتریسید و وسیع الطیف از گروه فلوروکینولون ها می باشد که از طریق مهار آنزیم DNA Gyrase DNA باعث توقف همانندسازی شده و DNA را به قطعات کوچک و غیر فعال تبدیل می نماید و در نتیجه باعث مرگ باکتری ها می شود. این دارو برای درمان بیماری های ناشی از باسیل ها و کوکسی های گرم منفی هوازی (اشرشیاکلی، سالمونلاد، پاستورولا، هموفیلوس) و باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوک، استریوتکوک، کورینه باکتریوم، کلستریدیوم، لیستریا منوسایتوژن) و همینطور مایکوپلاسمها استفاده می گردد.

پس از تزريري میزان ۲/۵ میلی گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن گوالسه حداکثر بعد از یک ساعت غلظت انروفلوكساسيين، ۰/۹ میلی گرم در هر میلی لیتر سرم خواهد بود ولی همزمان غلظت آن در بافت هایی از قبیل ریه، قلب، کبد، کلیه و سیستم لنفاوی ۲-۳ برابر غلظت دارو در CSF است. دارو هم از طریق کلیوی و هم از راه غیرکلیوی دفع می شود. بین ۱۵-۵۰ درصد دارو به صورت تعییر نیافته از طریق ادرار (هم از طریق ترشح توپولی و هم از طریق فیلتراسیون گلومرولی) دفع می گردد. باقیمانده دارو از طریق مذفوع دفع می شود. نیمه عمر دارو ۳ ساعت است.

موارد مصرف:

انروفلوكساسيين ۱۰٪ جهت درمان بیماری های ناشی از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسمها و نیز بعضی عفونت های ثانویه متعاقب بیماری های ویروسی بکار می رود. از این دارو در درمان عفونت های ادراری، تنفسی، گوارشی، پوستی و بافت های نرم استفاده می شود.

انروفلوكساسيين در گوالسه، گاو، گوسفند و بز بیشتر جهت درمان عفونت های گوارشی (سالمونلوز، کلی باسیلوز،