

# Exabiopen

Suspension for Injection

## اگزابایوپن

سوسیانسیون تزریقی



زیرپوستی یا داخل رگی تزریق نگردد، در حیواناتی با سابقه حساسیت این محصول با احتیاط تجویز گردد.

**ترکیب:**  
هر میلی لیترهای ۲۰۰/۰۰۰ واحد بنزیل پنی سیلین و ۲۵۰ میلی گرم دی هیدرواستریتومایسین می‌باشد.

### دوره متع منع مصرف:

شیر: ۳ روز  
گوشت: ۲۸ روز

### شرایط نگهداری:

در جای خشک و خنک (کمتر از ۱۵ درجه سلسیوس) دور از نور خورشید نگهداری شود. بعد از اولین استفاده، اگر داخل سرنگ کشیدن دارو تحت شرایط آسپیتیک موردنیاز این گونه محصولات انجام شود پن دی استرپ ثبات خود را به مدت یک ماه (در صورتی که در دمای کمتر از ۱۵ درجه سلسیوس نگهداری شده باشد) حفظ می‌کند. بعد از این مدت، باقی مانده دارو باید دور ریخته شود زیرا ممکن است برای استفاده مناسب نباشد.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود

### بسته بندی:

ویال ۲۵۰ میلی لیتری

### تاریخ انقضا:

۲ سال پس از تولید

### تولید کننده:

شرکت سیوا - اسپانیا

### موارد مصرف:

علیه طیف گسترده‌ای از باکتری‌های گرم متفاوت و گرم مثبت و گونه‌های لپتوسپیرا عمل می‌کند.  
نفوذ دی هیدرواستریتومایسین به باکتری بیماریزا به علت عملکرد پن سیلین که باعث آسیب به دیواری سلولی باکتری می‌گردد، افزایش می‌یابد.

**گاو، گوسفند و بز:**

آسیه‌های پوستی، اکتینومایکوز، عفونت‌های سم آرتربیت، شاربین علامتی، لیپتوسپیروز، متريت، پنومونی و برونوکپنومونی

**اسب:**

ورم پستان، نفریت، عفونت‌های سم و متريت

### مقدار و روش مصرف:

ویال را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.  
تزریق در همه گونه‌های حیوانات از طریق عضلانی و با دوز ۱/۵ میلی لیتر پن دی استرپ به ازای هر ۲۵-۵۰ کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه می‌باشد.  
درمان را ۱ تا ۲ روز بعد از برطرف شدن علائم ادامه دهید.

### احتیاط دارویی:

در هنگام تزریق شرایط استریل را رعایت کنید و محل تزریق را با الکل ضدغوفونی کنید. دارو از طریق