



ROOYAN
DAROU

محلول استریل تزریقی
Injectable solution

فلورفلوجکت®

Florfluject®

فلورفنیکل + فلونیکسین مگلوامین
Florfenicol + Flunixin meglumine

آنتی بیوتیک



زمان از بین می رود.

توصیه می شود که حیوانات در مراحل اولیه بیماری درمان شوند و پاسخ به درمان ۷۲ ساعت بعد ارزیابی گردد. در صورت عدم کاهش علائم تنفسی و یا تشدید بیماری نسبت به تغییر دارو اقدام گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۳۸ روز

موارد منع مصرف:

مصرف این دارو در حیواناتی که قبلاً به فلونیکسین یا فلورفنیکل افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است. مصرف این دارو در گاوهای ماده بالای ۲۰ ماهه به دلیل نزدیک بودن به مرحله شیرآوری توصیه نمی شود. در گاوهای شیری در طول شیرآوری و دوره خشکی استفاده نشود. بیشتر از دوز توصیه شده مصرف نشود.

موارد احتیاط:

از تماس مستقیم دارو با پوست، چشم و لباس ها جلوگیری شود. در صورت تماس اتفاقی با چشم، به مدت ۱۵ دقیقه با آب بشویید. در صورت تماس با پوست با آب و صابون شسته شود. در صورت تزریق ناگهانی به انسان، سریعاً به پزشک مراجعه شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. همزمان با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و کورتیکوستروئیدها استفاده نشود. در حیوانات مشکوک به زخم های گوارشی یا نارسایی کلیوی با احتیاط مصرف شود. اثرات فلورفنیکل روی عملکرد تولیدمثلی، آبستنی و شیرآوری بررسی نشده است. اگر فلونیکسین در فاز آزادسازی پروستاگلندین در سیکل فحلی تزریق شود ممکن است باعث به تعویق افتادن فحلی گردد.

آنافیلاکسی، نحوه تزریق نادرست و استفاده از این دارو با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا تجویز بیش از یک بار دارو به عنوان عوامل خطرزای مسبب مرگ در حیواناتی که با این محصول درمان شده اند، شناخته شده است. تزریق داخل سرخرگ یا کانال نخاعی می تواند منجر به مرگ شود.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۳۰ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

ظرف ۲۸ روز بعد از بازکردن دارو آن را مصرف نمایید.

بسته بندی:

ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

ترکیب:

هر میلی لیتر از دارو حاوی ۳۰۰ میلی گرم فلورفنیکل و ۲۷/۴ میلی گرم فلونیکسین مگلوامین (معادل با ۱۶/۵ میلی گرم فلونیکسین) می باشد.

حیوان هدف: گاو

مکانیسم اثر:

فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک باکتریوستات سنتتیک با طیف اثر گسترده علیه بسیاری از باکتری های گرم منفی و مثبت جدا شده از حیوانات اهلی می باشد. فلورفنیکل با اتصال به تحت واحد ۵۰S ریبوزوم و جلوگیری از سنتز پروتئین باکتری اثر خود را اعمال می کند. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده که فلورفنیکل علیه پاتوژن های ایجادکننده بیماری تنفسی گاوها (BRD) نظیر مانهمیما همولیتیکا و هیستوفیلوس سومنی اثر باکتریوسیدی دارد. ۶ ساعت پس از تزریق دارو کاهش تب سریعتری نسبت به درمان با فلورفنیکل به تنهایی مشاهده شده است.

موارد مصرف:

فلورفنیکل + فلونیکسین برای درمان بیماری تنفسی گاوها (BRD) ناشی از مانهمیما همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا، هیستوفیلوس سومنی، مایکو پلاسما بوویس و تب ناشی از BRD استفاده می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

دارو به صورت تک دوز زیرپوستی با دوز ۴۰ میلی گرم فلورفنیکل و ۲/۲ میلی گرم فلونیکسین برای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با ۲ میلی لیتر به ازای هر ۱۵ کیلوگرم وزن بدن توصیه می شود.

- تزریق فقط باید در ناحیه گردن انجام گیرد.
- بیشتر از ۱۰ میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود.

- ممکن است تورم در محل تزریق ایجاد شود که به مرور

