

کتوپروفن ۱۰٪
Ketoprofen 10%

این دارو در حین عفونت های تنفسی (پنومونی) همزمان با مصرف آنتی بیوتیک ها به منظور کاهش التهاب و کاهش ادم بات تتفصی توصیه می شود.

این دارو برای درمان التهابات مفصلی، استخوانی و التهابات بافت های نرم اطراف مفاصل مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:

اسب: روزانه ۲/۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی یا داخل وریدی (برای این منظور ۱/۱ سی سی از کتوپروفون ۱۰٪ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن دام) به مدت ۵ روز توصیه می شود.

گاو: روزانه ۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی یا داخل وریدی (برای این منظور ۱/۵ سی سی از کتوپروفون ۱۰٪ به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن دام) به مدت ۳ روز توصیه می شود.

زمان پریزی از مصرف:

گوشت: ۷ روز

شیر: ندارد.

موارد احتیاط:

صرف این دارو در انسان مجاز نمی باشد.

صرف این دارو در اسب های در حین مسابقه مجاز نمی باشد.

صرف این دارو در دام هایی که دارای نارسایی کبدی و یا کلیوی هستند مجاز نمی باشد.

تریک دارو در این دارو در اسب های در حین مسابقه مجاز نمی شود.

در صورت بروز رسوب از مصرف دارو خودداری نمایید.

شرایط نگهداری:

در دمای بین ۱۵ - ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

از بخ زدگی محافظت گردد.

بسننه بندی:

ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

ترکیب:

هر میلی لیتر دارو حاوی ۱۰۰ میلی گرم کتوپروفن می باشد.

مکاتیسم اثر:

کتوپروفن از طریق مهار آنزیم سیکلاکسیزناز که مهمترین آنزیم در تبدیل اسید آراشیدونیک به پروستاگلاندین، پروستاسیکلین و ترمبوکسان می باشد اثرات خدالتهابی و تسکینی خود را اعمال می نماید.

جذب این دارو متعاقب تزریق عضلانی بسیار سریع انجام

می شود. در اسب ۹۹٪ دارو پس از جذب به آلبومین پلاسما متصل می شود و سپس بطور وسیعی در بافت های مختلف توزیع می شود.

این دارو با غلطمن متناسب به مایع ساینوبویال های وتری و مقاصل می رسد.

متاپولیزه شدن کتوپروفن از طریق کونزوگاسیون انجام شده و استرالکوئرونینیک آن از طریق ادرار به خارج دفع می شود.

نیمه عمر این دارو در اسب ۱ ساعت می باشد و تکرار مصرف این دارو در دام هایی که دارای فعالیت کبدی و کلیوی طبیعی می باشد موجب تجمع دارو نمی شود.

مطالعات مختلف نشان داده است که کتوپروفن در مقایسه با داروهای خدالتهاب غیراستروئیدی از قبیل فنیل بوتاون دارای حاشیه امنیت وسیع تری می باشد. به طوری که مصرف این دارو تا ۵ برابر دوز توصیه شده در اسب هیچ گونه عوارضی از مسمومیت دارویی در پی نداشته است.

موارد مصرف:

کتوپروفن در گاو و اسب بویژه اسب های کورس بعنوان یک داروی مسکن و خدالتهاب و ضدتقریب قوی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعات بالینی انجام شده بر روی حیوانات مختلف مovid اثرات خدالتهاب تقام با اثرات تسکینی قوی در دام های مختلف پذیرف و پرش زیر می باشد:

اسب: درمان التهابات ساینوبویال های وتری، مقاصل، التهاب تاندون ها تقام با التهاب ساینوبویال های وتری، التهاب غضروف ها و استئوکندریت ها، التهابات ضریع استخوان، تورم لایه مورق سم (Laminitis)، التهاب بافت های نرم و درمان کمکی به منظور تسکین و بهبود التهابات بعد از اعمال جراحی کتوپروفن به منظور کاهش درد و درمان کولیک اسب (Colic) کاربرد دارد.

گاو: درمان التهابات غیرعفونی بافت پستانی در موقع اورام پستان فیزیولوژیک و یا همراه با آنتی بیوتیک ها جهت درمان التهابات عفونی پستان ها (Mastitis)، مصرف