

لینکو مایسین ۴۰٪
Lincomycin 40%**ترکیب:**

هر گرم حاوی ۴۰۰ میلی گرم لینکومایسین فعال می باشد.

مکانیسم اثر:

لینکومایسین یک آنتی بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد ۵۰S ریبوزومی از سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می کند و با مکانیسم فوق بر روی باکتری های گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، استافیلوکوک ها، کلستریدیوم ها و همچنین میکوپلاسماها موثر می باشد.

تداخل دارویی:

تجویز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت ۱ ماه مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای ۳۰-۱۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ساشه ۷۵ گرمی

موارد مصرف:

جهت درمان بیماری آنتریت نکروتیک (ورم روده نکروتیک) ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف:

جهت درمان آنتریت نکروتیک ۷۵ گرم در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی (معادل ۳۰ میلی گرم لینکومایسین در ۱ لیتر آب) به مدت حداکثر ۷ روز تجویز می گردد.

موارد منع مصرف:

مصرف در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون منع شده است.