

Mamifort

Intramammary suspension

مامی فورت

سوسپانسیون داخل پستانی



ترکیبات:

کلوکساسیلین
(به صورت کلوکساسیلین سدیم) ۲۰۰ میلی گرم
آمپی سیلین
(به صورت آمپی سیلین سدیم) ۷۵ میلی گرم

حیوان هدف:

گاو، گوسفند و بز

مقدار مصرف:

گاو: یک سرنگ مامی فورت در هر کارتیه هر ۱۲ ساعت یک بار. درمان کامل شامل ۳ دوز می باشد.

گوسفند و بز: نصف سرنگ مامی فورت در هر کارتیه هر ۱۲ ساعت یک بار. درمان کامل شامل ۳ دوز می باشد.

موارد مصرف:

ورم پستان های ایجاد شده بوسیله میکرو-ارگانیسم های حساس به ترکیب کلوکساسیلین / آمپی سیلین در گاو، گوسفند و بز

موارد منع مصرف:

در دام های دارای سابقه حساسیت به پنی-سیلین ها مصرف نشود.

در دام های دارای سابقه حساسیت به سفالوسپورین ها با احتیاط مصرف شود.

موارد احتیاط:

حیوانات باید به محض مشاهده اولین علایم ورم پستان و همیشه در طول دوره شیرواری، مورد درمان قرار گیرند. بعد از آخرین شیردوشی و قبل از تجویز این محصول، کارتیه باید کاملاً

تخلیه شده و با محلول ضدعفونی تمیز گردد. بعد از تجویز سرنگ پستان را بخوبی ماساژ دهید تا پخش سوسپانسیون در کارتیه تسهیل گردد.

اثرات جانبی:

مورد خاصی گزارش نشده است.

تداخل دارویی:

همراه با آنتی بیوتیک های باکتریوستات تجویز نشود.

مصرف بیش از اندازه:

بسیار بعید است که مصرف بیش از اندازه باعث مسمومیت گردد. نهایت دوز قابل تحمل ۵ برابر دوز توصیه شده می باشد.

دوره منع مصرف:

گوشت: ۷ روز

شیر: ۳ روز

شرایط نگهداری:

در جای خنک (کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس) و دور از نور آفتاب نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی:

جعبه های ۴ سرنگی و سطل های ۴۸ سرنگی

تولیدکننده:

شرکت سیوا - اسپانیا