



ماربوفلوکساسین ۱۰٪  
Marbifloxacin 10%

تهیه شده از مواد اولیه شرکت

F5 Fabbrica Italiana Sintetici  
ایتالیا



### ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول تزریقی حاوی ۱۰۰ میلی گرم ماربوفلوکساسین می باشد.

### حیوان هدف: گاو

### مکانیسم اثر:

ماربوفلوکساسین یک آنتی بیوتیک سنتتیک باکتریسیدال از گروه فلوروکینولون ها می باشد که از طریق مهار آنزیم DNA gyrase اثر خود را اعمال می کند. ماربوفلوکساسین علیه طیف وسیعی از باکتری های گرم منفی و گرم مثبت و مایکوپلازما موثر است.

### موارد مصرف:

درمان عفونت های تنفسی ناشی از *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma bovis*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni*  
درمان ورم پستان ناشی از *E. coli* در دوره شیرواری، متريت و اسهال عفونی در گوساله

### مقدار و نحوه مصرف:

**درمان عفونت تنفسی:** ۸ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با ۴ ml/۵۰kg برای یک بار تزریق عضلانی  
مقادیر بیش از ۲۰ میلی لیتر باید تقسیم شده و در دو یا چند محل مجزا تزریق گردد.

### درمان ورم پستان، متريت و اسهال گوساله:

۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که برابر است با ۱ ml/۵۰ kg روزانه بمدت ۵-۳ روز، بصورت تزریق زیر پوستی، اولین تزریق می تواند بصورت داخل وریدی انجام شود

تزریق عضلانی ممکن است باعث واکنش موقت موضعی نظیر درد در محل تزریق و ضایعات التهابی ماهیچه ای منجر به فیبروز گردد.  
تزریق زیر پوستی هم ممکن است به صورت موقت منجر به ادم خفیف و درد در محل تزریق گردد.

### زمان پرهیز از مصرف:

#### داخل عضله:

گوشت و احشاء: ۳ روز

شیر: ۷۲ ساعت

#### زیر پوست:

گوشت و احشاء: ۶ روز

شیر: ۳۶ ساعت

### موارد منع مصرف:

در حیواناتی که قبلا به سایر فلوروکینولون ها یا ماربوفلوکساسین حساسیت نشان داده اند استفاده نشود.

در حیواناتی که قبلا به سایر فلوروکینولون ها مقاومت نشان داده اند استفاده نشود.

### شرایط نگهداری:

در دمای اتاق (زیر ۳۰ درجه سلسیوس) و دور از نور نگهداری شود.

### بسته بندی:

ویال ۵۰ میلی لیتری