



هر راس گاو بالغ هر ۸-۱۲ ساعت
اسب: ۱-۵٪ میلی لیتر دارو به ازاء هر ۱۰
کیلوگرم وزن بدن هر ۸ ساعت به مدت ۳ روز
متوالی

ترکیب:
هر میلی لیتر حاوی ۴۰ میلی گرم جنتامایسین
(سولفات)

احتیاطات:

در حیوانات دارای سابقه حساسیت به این آنتی بیوتیک مصرف نشود
همزمان با سایر آنتی بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی
یا باکتریواستاتیک تزریق نشود.
در صورت مصرف مقادیر زیاد یا به مدت طولانی
می‌تواند دارای عوارض سمی کلیوی و گوارشی
باشد.
بیش از ۷ روز مصرف نشود.

مشخصات فارماکولوژیک:
آنتی بیوتیک باکتری کش آمینوگلیکوزیدی موثر
علیه میکروب‌های گرم منفی شامل آنترباکتر
آترورژن، کلیسیلا پنومونیه، پسودوموناس
آترورژنوز، اشربیشیا کولی، سالمونلاها، شیگلاها
و بعضی میکروب‌های گرم مثبت شامل تریپونما
هیویدیسانتریه، استافیلولکوس اورثوس و
استریوتوكوک‌های بتاهمولیتیک

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء، خوراکی گاو، گوسفند و بز: ۶۰ روز
شیر: ۲ روز

موارد مصرف و حیوان هدف:

برای مصرف در گاو، گوسفند، بز و اسب
گاو، گوسفند و بز: ورم پستان کلی فرمی،
کلی باسیلوز و سالمونالوز گوساله‌ها، مغوفت‌های
ادراری تناسلی و عفونت‌های مجاری تنفسی
اسب: کلی باسیلوز و سالمونالوز در کره اسب‌ها،
عفونت‌های ادراری تناسلی و عفونت‌های مجاری
تنفسی

شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری
شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

مقدار و روش مصرف:

بسته‌بندی:
ویال‌های ۵۰ میلی لیتری

گاو، گوسفند، بز و اسب: تزریق داخل عضله
یا داخل رگ بصورت آهسته

سازندۀ:
شرکت داروسازی رویان دارو

گاو، گوسفند و بز: ۱۰-۱۵٪ میلی لیتر از دارو
به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن هر ۸-۱۲ ساعت

گاو بالغ: ۵٪ میلی لیتر دارو به ازاء هر ۱۰
کیلوگرم وزن بدن یا ۲۵ میلی لیتر دارو برای