

متاژین®

Metagin®



محلول استریل تزریقی  
Injectable solution

ROOYAN  
DAROU

متامیزول سدیم  
Metamizole sodium



#### ترکیب:

هر میلی لیتر از محصول حاوی ۵۰۰ میلی گرم متامیزول سدیم می باشد.

#### حیوانات هدف:

اس، گاو، گوسفند، بز و سگ

#### مکانیسم اثر:

متامیزول (دی پیرون) یکی از قویترین ضد دردهای غیر اپوئیدی است که دارای اثرات همزمان ضد تپ و ضد درد می باشد. مکانیسم ضد درد دارو پیچیده است و احتمالاً بر اساس مهار سیکلوکسیتران مرکزی<sup>۳</sup> (مشتق سیکلوکسیتران ۱ که عمدتاً در مغز یافت می شود) و فعالسازی سیستم اپوئیدی و کاتاپینوئیدی می باشد. متامیزول می تواند مسیرهای تپ ایجاد شده بواسیله لیپوپلی ساکارید را (هم واسطه با بروستاگلکنین و هم غیر واسطه به بروستاگلکنین) مهار کند که این امر نشان می دهد که فعالیت ضد تپ این دارو با داروهای NSAIDs تفاوت دارد. مکانیسم ضد اسپاسم متامیزول ناشی از کاهش سنتز آینوزینول فسفات است که منجر به مهار آزادسازی کلسیم داخل سلولی می شود. مشتقان متامیزول می توانند به آسانی از سد مغزی خونی عبور کنند که میزان غلظت آنها در مایع مغزی خناعی برای ایجاد اثرات درمانی کافی می باشد.

متامیزول عمدتاً در درمان درد با علت های مختلف، شرایط اسپاسم بخصوص در دستگاه گوارش و تب برگشت کننده با سایر درمان ها به کار برده می شود.

#### موارد مصرف:

این دارو در مواردی که نیاز به اثر ضد درد، ضد اسپاسم، ضد تپ و ضد التهاب متامیزول باشد به کار برده می شود.

- درمان درد ناشی از کولیک با دلایل مختلف درمان حمایتی اسهال

- بیماری های همراه با تپ نظری ورم پستان، تب<sup>۳</sup> روزه و پاستورلوز

- اشکال حاد و مزمن آرتربیت، وضعیت های روماتیسمی، التهاب عصب، تاندون و غلاف ان

- میوگلوبینوری فلاح شونده در اسپ

- درمان درد پس از جراحی یا اعمالی نظیر اخته کردن و نعل بندی

- انسداد مری

#### موارد منع مصرف:

این دارو نباید در حیواناتی که دچار اختلال سیستم خونساز هستند استفاده شود. دارو نباید به روش زیر پوستی استفاده شود. در گریه مصرف نشود.

#### مقدار و نحوه مصرف:

اسب: ۲-۵ میلی لیتر بازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل رگی

گاو، گوسفند و بز: ۲-۴ میلی لیتر بازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل رگی یا عضلانی

سگ: ۰۴-۰۰ میلی لیتر بازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت داخل رگی یا عضلانی

در صورت نیاز می توان تزریق را تکرار کرد.

#### زنگنهی از مصرف:

**گوشتش (عضلاتی):** گاو: ۱۲ روز، گوسفند و بز: ۱۸ روز

**شیر (عضلاتی):** گاو: ۲ روز یا ۴ وعده شیردوشی.

گوسفند و بز: ۳ روز یا ۶ وعده شیردوشی

#### توصیه های ویژه:

صرف همزمان دارو با کلرپرومازین می تواند منجر به هیبووترمیای شدید گردد.

#### موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

#### شرایط نگهداری:

در مکان خشک دور از نور و در دمای اتفاق (زیر ۲۵ درجه سلسیوس) نگهداری شود.

حداقل زمان استفاده پس از اولین مصرف ویال ۴ هفته می باشد.

#### بسته بندی:

ویال ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری