

Multiject IMM

Intramammary Suspension

مولتی جکت آی.ام.ام

سوسپانسیون استریل داخل پستانی

- شرایط آسپتیک همیشه باید مدنظر باشد.

زمان پرهیز از مصرف

شیر: ۱۰۸ ساعت پس از آخرین مصرف

گوشت: ۷ روز پس از آخرین مصرف



موارد احتیاط

جهت جلوگیری از تماس با دست هنگام مصرف از دستکش استفاده کنید.

پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها در صورت تزریق، تنفس، خورده شدن یا تماس با پوست می توانند باعث واکنش های شدید حساسیتی شوند.

حساسیت شدید به پنی سیلین ها می تواند واکنش متقاطع با سفالوسپورین ها یا برعکس را به همراه داشته باشد.

حساسیت به این داروها گاهی می تواند بسیار جدی باشد.

۱ - اگر می دانید به این داروها حساس هستید به آنها دست نزنید.

۲ - این محصول را به منظور جلوگیری از تماس با دیگران با احتیاط حمل کنید.

۳ - اگر پس از تماس علایمی نظیر جوش های پوستی دارید حتماً با پزشک مشورت کنید.

تورم صورت، لب ها یا چشم ها و تنفس دشوار علایم جدی تری می باشند که نیاز به مراقبت پزشکی فوری دارند.

دست ها را پس از مصرف بشویید.

هر سرنگ یکبار باید مصرف شود.

سرنگ هایی که نصفه مصرف شده اند باید دور ریخته شوند.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری

زیر ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

بسته بندی

هر بسته حاوی ۲۴ سرنگ تک دوز یکبار مصرف می باشد.

تولیدکننده:

شرکت نوربروک - ایرلند

مولتی جکت آی.ام.ام جهت درمان ورم پستان حاد و تحت حاد ناشی از عفونت باکتریایی در گاوهای شیروار مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیب ۳ آنتی بیوتیک در این محصول ترکیبی نیرومند را ارائه می دهد که همراه با پردنیزولون موجود در آن باعث کاهش التهاب پستان ملتهب می شود.

محتویات در هر سرنگ ۵ گرمی:

پروکانین پنی سیلین ۱۰۰ میلی گرم

استرپتومایسین سولفات ۱۰۰ میلی گرم

نئومایسین سولفات ۱۰۰ میلی گرم

پردنیزولون ۱۰ میلی گرم

بر پایه روغن معدنی قابل حل در شیر

طیف وسیع فعالیت

مولتی جکت آی.ام.ام جهت درمان ورم پستان حاد و تحت حاد گاوهای شیروار به کار می رود. بدلیل وجود پنی سیلین، استرپتومایسین و نئومایسین داخل این محصول، طیف اثر آن گسترده بوده و علیه اکثر باکتری ها موثر می باشد. ترکیب این ۳ آنتی بیوتیک با هم باعث حداکثر فعالیت داخل پستان عفونی شده و طیف اثر آنها را گسترده تر و درمان را تسریع می بخشد.

وجود یک ضدالتهاب مانند پردنیزولون داخل این محصول باعث بی نظیر بودن آن نسبت به سایر محصولات مشابه شده و درد و التهاب ناشی از عفونت باکتریایی داخل پستان را کاهش می دهد.

دوز و نحوه مصرف

- قبل از مصرف سر پستانک باید کاملاً تمیز و ضدعفونی شود.

- محتویات یک سرنگ باید درست بلافاصله پس از شیردوشی به داخل کارتیه از طریق مجرای سرپستانک یکبار در روز برای ۳ روز متوالی تزریق شود.