



ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ۲۰۰ میلی گرم نئومایسین سولفات می باشد.

موارد مصرف:

این دارو در دام و طیور و به منظور درمان اسهال سفید در گوساله ها، کلی باسیلوز گوسفند و بز، سالمونلوز گاو و گوسفند و آنتربت های طیور مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار ونحوه مصرف:

جوجه های گوشتی:

- از یک روزگی تا ۲ هفتگی به میزان ۱ میلی لیتر در ۴ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- از ۳ تا ۵ هفتگی به میزان ۱ میلی لیتر در ۳ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- از ۶ هفتگی تا پایان دوره پرورش به میزان ۱ میلی لیتر در ۲/۵ - ۲ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

بوقلمون ها:

- از ۱ تا ۲ روزگی به میزان ۱ میلی لیتر در ۲/۵ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- از هفته دوم تا پایان ۸ هفتگی به میزان ۱ میلی لیتر در ۱/۵ آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز
- از ۹ تا ۲۶ هفتگی به میزان ۱ میلی لیتر در ۱/۲ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

گاو، گوسفند و بز:

۱۱ میلی لیتر از محلول به ازای هر ۱۰۰ کیلو گرم وزن بدن (۲۲ میلی گرم نئومایسین سولفات به ازای هر کیلو گرم وزن بدن) در آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی: ۵ روز

گوساله: ۳۰ روز

بره و بزغاله: ۲۰ روز

مصرف شیر دو روز پس از درمان و تخم مرغ ۱۴ روز پس از درمان گله مجاز است.

موارد احتیاط:

در موارد حساسیت به آمینوگلیکوزیدها از مصرف این دارو خودداری شود. به علت دفع اولیه دارو از کلیه، در نارسایی های کلیوی توصیه نمی شود. در زمان گرفتگی و یا انسداد روده، مصرف خوراکی نئومایسین منع شده است. از مصرف این دارو در حیوانات تازه متولد شده و پیر به علت افزایش توکسیسیتی اجتناب گردد. مصرف خوراکی نئومایسین در درازمدت می تواند پرزهای دستگاه گوارش را از بین ببرد، علاوه بر این مصرف خوراکی این دارو تا حدودی اثر مسهل دارد که چندان قابل توجه نیست. آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی ۱۲ ساعت پس از تهیه مصرف شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین ۲۵-۱۰ درجه سلسیوس، دور از تابش نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.

بسته بندی:

ظروف ۱ لیتری