

واکسن سه گانه کشته

OLVAC A+B

علیه بیماری های : نیوکاسل - برونشیت عفونی
- سندروم کاهش تولید تخم مرغ



سن ۱۸ هفتگی، که قبلاً توسط واکسن های زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل و برونشیت واکسینه شده باشند، توصیه می شود.
ترزیق واکسن به میزان ۵/۰ میلی لیتر به دو صورت زیرپوستی (قاعده گردن) و یا داخل عضلانی (اعضله سینه).

توجه: قبل از مصرف اجزه دهید تا واکسن با درجه حرارت اتاق منطبق گردد.
قبل از مصرف و به هنگام مصرف، بطری واکسن را به خوبی تکان دهید.

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت مابین ۲ تا ۸ سلسیوس نگهداری شود (درجه حرارت یخچال).
از فریز کردن واکسن خودداری نمایید.

بسته بندی:

فلakan ۵۰۰ میلی لیتری ۱۰۰۰ دوزی

تولیدکننده:

شرکت فاترو - ایتالیا

خصمومیات واکسن:

- این واکسن از آنتیژن های بسیار ایمنی زای:
- نیوکاسل (سویه سوتا)
- برونشیت عفونی سه سویه ای (ماسابقوست (D 1466) M41 و (D 247) NEV 24 NEV 14
- سندروم کاهش تولید تخم مرغ (EDS 76) تشکیل شده است.

ترکیب واکسن:

یک دوز از واکسن شامل:
کشته نیوکاسل $> 10^{8.5}$ EID50 Newcastle ویروس $> 10^{7.5}$ EID50 Adenovirus ویروس EDS کشته سندروم کاهش تولید تخم مرغ $> 10^{7.5}$ EID50 Infectious Bronchitis (IB) ویروس کشته برونشیت عفونی

موارد مصرف:

ایجاد ایمنی و پیشگیری از بیماری های نیوکاسل، برونشیت عفونی و سندروم کاهش تولید تخم مرغ در گله های مرغ مادر و تخمگذار.

میزان و نحوه مصرف:

جهت ایجاد ایمنی در مرغ های مادر حدوداً در