

واکسن چهار گانه کشته

علیه بیماری های : نیوکاسل، برونشیت عفونی،
گامبورو و سندروم کاهش تولید تخم مرغ

OLVAC A+B+G



میزان و نحوه مصرف:

مقدار نیم سی سی به صورت زیرپوستی در پیش نایحه گردن تزریق شود.
واکسیناسیون باید در پرندگان قبل از ورود به مرحله تخمگذاری (در طی هفتاد های ۱۶ الی ۱۸ زندگی) و متعاقباً پس از دریافت واکسن های زنده نیوکاسل، برونشیت و گامبورو در دوره پرورش صورت پذیرد.

توجه: قبل از استفاده از واکسن، درجه حرارت آن را به درجه اتاق برسانید.

قبل از استفاده از واکسن، فلاکن را خوب تکان دهید.

شرایط نگهداری::

در درجه حرارت ما بین ۲ تا ۸ سلسیوس نگهداری شود (درجه حرارت بخچال). از فریز کردن واکسن خودداری نمایید.

عمر قفسه ای:

۲۴ ماه

بسته بندی:

فلاکن ۵۰۰ میلی لیتری ۱۰۰۰ دوزی

تولیدکننده:

شرکت فاترتو - ایتالیا

موارد مصرف:

واکسیناسیون مرغ های مادر علیه نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندروم کاهش تولید تخم مرغ (EDS 76) و گامبورو. در طی هفتاد های اول زندگی، جوجه های به دست آمده از گله های OLVAC A+B+G که واکسن دریافت نموده اند، از طریق آنتی بادی مادری در برابر گامبورو محافظت خواهند شد.