

# کیمیوکولی

انروفلوکسازین ۱۰٪  
 محلول خوراکی

# Quimiocoli

ENROFLOXACINE 10%  
Oral Solution



## ترکیبات:

هر لیتر محصول حاوی:  
 انروفلوکسازین ۱۰۰ مگ گرم  
 اکسپیان ۱۰۰۰ میلی لیتر  
**مکانیسم اثر:**

انروفلوکسازین یک آنتی بیوتیک باکتریسید و متعلق به نسل سوم خانواده کینولون ها می باشد. این آنتی بیوتیک از عملکرد آنزیم DNA gyrase جلوگیری می نماید. متعاقب مصرف خوراکی، غلظت درمانی آن در بافت ها به سرعت ایجاد می گردد. حداقل غلظت پالسماهی آن بین  $0.5/\text{ت} \cdot \text{تا} \cdot 2/5$  ساعت به دست می آید. نیمه عمر آن در پلاسمای حدود ۲ تا ۶ ساعت می باشد. دفع انروفلوکسازین از طریق کلیوی و صفر اوی صورت می پذیرد.

## موارد مصرف:

درمان سی آر دی کپلکس، عفونت های دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری و بیماری های عفونی که توسط عوامل زیر ایجاد می شوند:

- مایکوپلاسمایا
- باکتری های گرم منفی: ایکولای، سالمونلا، هموفیلوس

پاستورلا، بوردتلا برونشی سپتیکای، سیتروباکتر، انتروباکتر، کلیسیل پروتونوس، پسودوموناس، بارتولنا، انتروكوکوس و اکتینیوباسیلوس بلور و پنومونیه - باکتری های گرم مثبت: استافیلواکوکوس و استرپتوکوکوس

## مقدار و نحوه مصرف:

برای مصرف در آب آشامیدنی:  
 $0.5\text{ میلی لیتر از کیمیوکولی در هر لیتر آب آشامیدنی}$   
 به مدت ۳ تا ۵ روز

در موارد درگیری های سالمونلایی می توان دوز را تا  $0.5\text{ میلی لیتر از کیمیوکولی در هر لیتر آب آشامیدنی}$  دو برابر افزایش داد.

## موارد منع مصرف:

در مرغ های تخمگذار مصرف نشود.

## موارد احتیاط:

در دوز های تومیه شده هیچ گونه مسمومیتی دیده نخواهد شد. داروها و مکمل هایی که حاوی منیزیم و آلومنیم هستند به دلیل ایجاد شلات ها جذب انروفلوکسازین را کم خواهند کرد.

**تدابیر دارویی:**  
 با سولفونامیدها، تری متوفوریم، مانکرولیدها، تتراسایکلینها، نیتروفورانها و کلامفینیکل تداخل دارد. هم زمان با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مصرف نشود.

## عوارض جانبی:

در دوز های تومیه شده عوارض جانبی دیده نمی شود. در درمان های طولانی مدت ممکن است اختلالاتی در عملکرد دستگاه های عصبی، گوارشی و ادراری مشاهده شود.

## درمان و تجویز دوزهای بالا:

تا ۵ برابر دوز تومیه شده هیچ گونه علایم خاصی دیده نمی شود. در دوز های بالا ممکن است عوارض عصبی دیده شود. در چنین مواردی درمان را قطع نموده و آب خالی به حیوان خورانده شود.

## دوره پرهیز از مصرف:

گوشتش: ۱۴ روز

## شرابی نگهداری:

در مکان خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

## دفع ظروف خالی:

بر طبق قوانین کشور مزبور صورت پذیرد.  
**بسته بندی:**

ظرف ایتری

**تولیدکننده:** شرکت داروسازی رویان دارو تحت لیسانس کمپانی MAYMO اسپانیا