

گلو تار آل دئید + ترکیبات چهار تایی آمونیوم + اسید فسفریک
Glutaraldehyde + Quaternary ammonium
+ Phosphoric acid + Isopropyl alcohol + Methanol



ضد عفونی کننده و شوینده

۱۰۰ مترمکعب فضا (از محلول رقیق شده به نسبت ۱ به ۲۰۰) مورد استفاده قرار گیرد. این عمل باید ۲ بار در روز انجام شود و استفاده از دوز پیشنهادی اثرات جانبی سویی برای جوجه ها به همراه نخواهد داشت.

سالن های مرغداری و گاوداری و اصطبل ها:

- وسایل را تخلیه نموده، بستر و کود را از محل خارج کنید.

- برای حصول بهترین نتیجه، قبل از گندزایی، سطوح را کاملاً تمیز نمایید.

- کلیه سطوح را با فارم واش® بشویید.

- تمامی سطوح را با فشار کم اسپری نمایید. تا ماده گندزدا تمام سطوح را بپوشاند.

شرایط نگهداری:

درب ظروف را کاملاً بسته و در محلی خنک (۱۵-۸ درجه سلسیوس) با تهویه مناسب و به دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری نمایید.

موارد احتیاط:

- به هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید.

- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

- از تماس مستقیم محلول غلیظ با پوست خودداری کنید.

- از آشامیدن و استنشاق محلول غلیظ اجتناب کنید.

- در صورت تماس محلول رقیق شده با چشم و یا پوست، محل را فوراً با آب پاکیزه و به دفعات شستشو دهید.

- در صورت آشامیدن یا استنشاق تصادفی سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

(لطفاً برچسب ضد عفونی را به همراه داشته باشید.)

- از مخلوط نمودن محلول با سایر مواد شیمیایی پرهیز کنید.

- از پاشیدن محلول بر روی منابع غذا و آب خودداری نمایید.

بسته بندی:

ظروف ۵ لیتری

ترکیب:

گلو تار آل دئید

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید ۴ درصد وزنی

اسید فسفریک ۰/۸ درصد وزنی

ایزوپروپیل الکل ۲/۵ درصد وزنی

متانول ۱ درصد وزنی

آب دیونیزه ۱۰۰ درصد وزنی

موارد مصرف:

به عنوان قسمتی از برنامه شستشو و گندزایی در انواع اماکن پرورش دام و طیور مانند سالن های مرغداری، مراکز جوجه کشی، گاوداری ها و نیز وسایل مورد استفاده در آن ها توصیه می شود.

- موثر بر باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها

- مقرون به صرفه و اقتصادی، با رقت ۱ به ۲۰۰ برای منظورهای مختلف

- غیر سمی و غیر محرک در رقت های معمولی، بدون اثر لکه و رسوب

- موثر بر میکروارگانیسم ها، بدون اثر خوردگی، با فرمول انحصاری

- پایداری تا ۸ هفته بر روی سطوح تمیز شده توسط فارم واش®

مقدار و نحوه مصرف:

به نسبت ۱ به ۵۰ قسمت آب در مناطق آلوده و با ریسک بالا و به نسبت ۱ به ۲۰۰ قسمت آب جهت پیشگیری در مناطقی که ریسک انتشار بیماری پایین است روی سطوح اسپری شود. جهت گندزایی هوا به نسبت ۱ به ۲۰۰ رقیق کرده و به صورت مه پاش به نسبت یک لیتر برای