

سالینومایسین ۱۲%
Salinomycin 12%



سالینوکوکس®

مقدار و نحوه مصرف:

وجهه های گوشتنی: ۵۰۰ گرم سالینوکوکس® در هر تن خوارک از یک روزگی تا ۵ روز قبل از کشتار. پولت های جایگزین تخم گذار: ۵۰۰ گرم سالینوکوکس® در هر تن خوارک از یک روزگی تا حداقل ۱۲ هفتگی. جهت گرفتن بهترین نتیجه، در مخلوط شدن یکنواخت دارو با دان دقت نمایید، به این منظور توصیه می شود ابتداء مقدار مورد نظر دارو را با پنج برابر وزن آن از خوارک به خوبی مخلوط نموده و سپس آن را به حجم اصلی خوارک اضافه کرده، مجدداً مخلوط نمایید.

زمان پرهیز از مصرف:

۵ روز قبل از کشتار در جوجه های گوشتنی و ۷ روز قبل از شروع تخم گذاری در گله های تخم گذار.

تداخل دارویی:

سالینوکوکس® با تیامولین تداخل اثر داشته و ضمن کاهش رشد می تواند باعث تلفات شود. حداقل هفت روز باید بین مصرف متوالی این دو دارو فاصله وجود داشته باشد.

موارد احتیاط:

در طی آماده سازی از ماسک ضد غبار، دستکش و لباس محافظ استفاده شود و پس از آن دست ها با آب و صابون شستشو داده شود.

در طیور تخمگذاری که تولید آنها به مصرف انسان می رسد مصرف نشود. در اسب و سایر تک سمی ها کشنده است.

همراه با سایر کوکسیدیو استات ها که مکانیسم اثر مشابه دارند مصرف نشود.

در بوقلمون ها به دلیل بروز مسمومیت مصرف نشود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت های ۱ و ۵ کیلوگرمی

تربیت:

هر کیلوگرم سالینوکوکس® حاوی ۱۲۰ گرم سالینومایسین سدیم است.

مکانیسم اثر:

سالینوکوکس® یک داروی کوکسیدیو استات یونوفوره است که با یون های سدیم و پتاسیم ایجاد کمپلکس های قابل حل در چربی می نماید و بدین طریق باعث افزایش نفوذپذیری غشاء تک یاخته نسبت به این یون ها می شود. با افزایش غلظت یون های مثبت در درون سلول، پمپ سدیم - پتاسیم در غشاء سلول فعال شده و با مصرف ATP به صورت فعال شعال شروع به خارج کردن این یون ها از سلول می نماید. پس از مدتی ذخیره ATP سلول به بیان می رسد و پس از آن در اثر خاصیت اسمزی آب به درون سلول تک یاخته نفوذ می کند و در نتیجه سلول متورم شده، اعمال اندام های درون سلولی مختلف و در نهایت انگل منهدم می شود. سالینوکوکس® کوکسیدیو استات وسیع الطیفی است که روی مژو زوئیت ها، اسپروروزوئیت ها و همچنین سبزیونت های بالغ تمام گونه های یاتوئن ایمربای طبیور شامل ایمربای تنا، ایمربای نکاتریکس، ایمربای برونتی، ایمربای ماگریما و ایمربای اسرولینا موثر است.

موارد مصرف:

سالینوکوکس® به عنوان کوکسیدیو استات جهت کنترل و پیشگیری کوکسیدیو ز در جوجه های گوشتنی و پولت های جایگزین تخمگذار به کار می رود. سالینومایسین باعث بهبود ضریب تبدیل مواد غذایی نیز می گردد و روی کیفیت لاشه نیز اثر سوء ندارد.