

مقدار و روش مصرف: تزریق عضلانی
گاو: ۲ میلی لیتر



احتیاطات:

داخل رگ تزریق نشود.
در صورت اطلاع از حساسیت حیوان به مواد
موثره این دارو مصرف نشود.

در صورت وجود بیماری های اسپاستیک (Spastic)
در دستگاه های تنفسی یا گوارشی، مصرف
نشود.

صرف هم زمان با داروهای ضدالتهاب
غیراستروئیدی ممکن است باعث کاهش تاثیر
کلورهستنول شود.
صرف هم زمان با اکسی توسین یا مواد اکسی
توسیک باعث افزایش اثر کلورهستنول
می شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

دوره پرهیز از مصرف:
گوشت و احشاء: روز
شیر: ندارد

شرایط نگهداری:
در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:
ویال ۱۰ میلی لیتری

سازنده:
شرکت داروسازی رویان دارو
تحت لیسانس کمپانی MAYMO اسپانیا

ترکیب:
هر میلی لیتر حاوی ۲۵۰ میکروگرم کلورهستنول
(سدیم) می باشد.

خواص فارماکولوژیک:
کلورهستنول یک ترکیب سنتیک آنالوگی از
پروستاکلاندین F2 α است. این دارو دارای
خاصیت قوی لوتوولیتیک (تحلیل برندۀ جسم
زرد تخدان) است که باعث کاهش ناگهانی
میزان هورمون پرورستررون می شود.
در حیوانات ماده سالم و غیرآبستن تحلیل جسم
زرد باعث بروز فحلی ۴-۵ روز پس از تزریق
می شود.

در حیوانات دارای جسم زرد ماندگار (جین
ومومیابی شده، کیست های تخدمانی لوتئینی،
عفونت های رحمی و غیره) لوتوولیز ناشی از
تزریق دارو معمولاً منجر به رفع مشکل و
بازگشت به سیکل فحلی می شود.

در حیوانات آبستن تزریق این دارو می تواند
بر حسب دوره آبستنی باعث سقط جینین شود.

مواد مصرف و حیوانات هدف: گاو
قطع آبستن: تا روز ۱۵۰ آبستنی باعث سقط
جینین طی ۴-۵ روز بعد از تزریق می شود.
به عنوان درمان کمکی پیومتر و اندومتریت
بعد از زایمان.
کنترل فحلی