



سولفادیازین ۲۰٪ + تری متوبیریم ۴٪

Sulfadiazine 20% + Trimethoprim 4%



مقدار و نحوه مصرف:

گاو: ۱ میلی لیتر از محلول به ازای هر ۱۶ کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق داخل عضلانی یا تزریق آهسته داخل وریدی

اسب: ۱ میلی لیتر از محلول به ازای هر ۱۶ کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق آهسته داخل وریدی

سگ و گربه: ۱ میلی لیتر از محلول به ازای هر ۸ کیلوگرم وزن بدن تنها از طریق زیرپوستی جایگاه توصیه شده برای تزریق در سگ، پوست شل بالای گردن می باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشتش: ۱۰ روز پس از آخرین تزریق

شیر: ۳ روز پس از آخرین تزریق

موارد منع مصرف:

این دارو در حیوانات با نارسایی های کبدی یا کلیوی و همچنین در موارد حساسیت به سولفونامیدها ممنوع است.

موارد احتیاط:

صرف طولانی دارو ممکن است منجر به کاهش اسیدوفولیک دیسکارازی خونی و کریستالوری گردد. آماس موضعی وقت در محل تزریق دارو و نیز بروز شوک به دنبال تزریق سریع وریدی می تواند رخ دهد.

شرایط نگهداری:

در دمای بین ۱۵-۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

تراكیب:

هر میلی لیتر از دارو حاوی ۲۰۰ میلی گرم سولفادیازین (سدیم) و ۴۰ میلی گرم تری متوبیریم می باشد.

مکانیسم اثر:

این دارو ترکیبی از یک نوع سولفونامید (سولفادیازین) و دی آمینوپریمیدین (تری متوبیریم) می باشد که از طریق مهار آنزیم PABA در روند ساخت اسیدوفولیک در مراحل مختلف آنژیمی ممانعت ایجاد کرده و در نتیجه فعالیت حیاتی باکتری متنوقف می گردد. این دو ماده با اثر سینترزیسم بر یکدیگر از تشکیل اسید دی هیدروفولیک که برای ساخت اسیدونوکلئیک لازم بوده ممانعت به عمل می آورند.

موارد مصرف:

این دارو چهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن در درمان عفونت های ناشی از ارگانیسم های حساس به تری متوبیریم و سولفادیازین در اسب، گاو، سگ و گربه توصیه می گردد. طیف درمانی دارو شامل بعضی از گونه های استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشنر شیاکلی، اکتینومایسیس، اکتینومایسین، کلبسیلا، لیستریا منوسیتوژن، سالمونلا، پروتئوس میرابیلیس، پاستورلا، آنتروباکتر آنروژن، هموفیلوس آنفاآنزا، ویبریو، بروسلا و کورینه باکتریوم های شود.

این دارو می تواند در درمان عفونت های ادراری - تناسلی، گواراشی، تنفسی و عفونت های دیگر از جمله عفونت سم، تورم مفصل، ورم پستان، عفونت های چشم، گوش و دهان موثر واقع شود.