

Syvaquinol 10%

Enrofloxacin

Oral Solution

سیواکینول ۱۰٪

انروفلوكساسين

محلول خوراکی



تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان این دارو با ماکروالیدها و تتراسایکلین‌ها پرهیز شود. همچنین مصرف توام این دارو با ضدالتهاب‌های غیراستروئیدی ممنوع می‌باشد.

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت:

۴ روز

شرایط نگهداری:

در مکان خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته‌بندی:

ویال‌های ۱۰۰ و ۵۰۰ میلی‌لیتری و بطری‌های ۱ و ۵ لیتری

تولیدکنندۀ:

شرکت داروسازی سیوا اس ای اسپانیا

ترکیب:

هر لیتر از محلول حاوی ۱۰۰ مگرم انروفلوكساسین می‌باشد.

مقدار مصرف:

یک میلی‌لیتر از سیواکینول ۱۰٪ به ازای هر ۱۰ کیلوگرم از وزن زنده بدن طیور تجویز می‌گردد که این میزان را در آب آشامیدنی حل نموده و به مدت ۳ تا ۵ روز در اختیار پرندگان قرار دهید.

میزان توصیه شده با حل کردن ۵/۵ میلی‌لیتر از محلول سیواکینول ۱۰٪ در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی طیور به دست خواهد آمد.

مقادیر دارویی فوق الذکر می‌توانند در درمان سالمونلوز و عفونت‌های شدید تا دو برابر دوزهای یاد شده تجویز شوند. بدیهی است در طول درمان محلول رقیق شده باید به صورت روزانه و تازه تهیه شده و در اختیار پرندگان قرار گیرد.

روش مصرف:

این محلول باید در آب آشامیدنی طیور حل شده و مورد مصرف قرار گیرد.