



داشته باشند.

احتیاطات مربوط به کاربرد

متعاقب تزریق، استنشاق، خوردن یا تماس پوستی با پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها ممکن است عوارض واکنش ازدیاد حساسیت (آلرژی) مشاهده گردد. ازدیاد حساسیت نسبت به پنی‌سیلین‌ها ممکن است منجر به حساسیت متقاطع به سفالوسپورین‌ها گشته و عکس این قضیه نیز صادق است. واکنش‌های آلرژیک نسبت به این مواد بعضاً ممکن است بسیار خطرناک باشد.

۱ - چنانچه از حساسیت خود نسبت به این مواد آگاهی دارید، از کار با این مواد اجتناب نمایید.

۲ - حین کار با این مواد حداکثر احتیاطات مربوطه را به کار برید تا از تماس یا در معرض قرار گرفتن با این مواد جلوگیری به عمل آید.

۳ - چنانچه پس از در معرض قرار گرفتن با این مواد علایمی مانند جوش پوستی ظاهر شد، به پزشک مراجعه نموده و این برگه را به وی نشان دهید.

۴ - در صورت بروز عوارضی مثل تورم صورت، لب‌ها یا چشم‌ها یا دشواری در تنفس بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید.

تماس با چشم: با مقادیر زیادی آب تمیز و روان چشم‌ها را شستشو نمایید.

تماس با پوست: ناحیه مزبور را با آب فراوان شستشو دهید.

خوردن: اگر به صورت ناگهانی مقادیری از دارو خورده شد به پزشک مراجعه نموده و لیبل یا بروشور دارو را به پزشک ارائه نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

فقط جهت مصرف در حیوانات

احتیاطات دارویی

در حرارت زیر ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود. قبل از مصرف سرنگ را کاملاً تکان دهید.

سرنگ‌ها یک بار مصرف بوده و محتویات باقی مانده داخل سرنگ‌ها بایستی دور ریخته شوند.

از یخ‌زدن فرآورده جلوگیری به عمل آید. دور از تابش نور نگهداری شود.

اطلاعات بیشتر

دفع باقی مانده‌های دارویی و محصولات منقضی شده براساس قوانین کشور مربوطه صورت پذیرد.

پسته بندی

جعبه‌های ۲۰ عددی سرنگ‌های ۱۰ میلی‌لیتری یک بار مصرف با قابلیت اعطاف

تولیدکننده:

شرکت زوتیس - ایرلند

ترکیب

سوسپانسیون روغنی استریل به رنگ سفید تیره (خاکستری روشن)

هر سرنگ ۱۰ میلی‌لیتری حاوی:

نووایوسین (به شکل نووایوسین سدیم) ۱۰۰ میلی‌گرم

نئومایسین (به شکل سولفات نئومایسین) ۱۰۵ میلی‌گرم

پنی‌سیلین پروکائین ۱۰۰ میلی‌گرم

دی‌هیدرو استریتومایسین

(به شکل سولفات دی‌هیدرواستریتومایسین) ۲۵ (میلی‌گرم)

پردنیزولون ۱۰ میلی‌گرم

موارد کاربرد

ضدباکتریایی و ضد التهاب.

تترا دلتا® جهت درمان ورم پستان گاوهای شیروار بکار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف

داخل پستانی: قبل از مصرف تترا دلتا® را به خوبی تکان دهید. پس از شیردوشی سرپستانک کارتیبه درگیر را کاملاً تمیز و ضد عفونی نمایید. محتویات یک سرنگ را به داخل هر کارتیبه تزریق نمایید. تجویز محتویات یک سرنگ کامل (۱۰ میلی‌لیتر) به داخل هر کارتیبه کاملاً موثر واقع خواهد شد. در صورت نیاز درمان را می‌توان ۲۴ یا ۴۸ ساعت بعد تکرار کرد. چنانچه قرمزی و تورم کارتیبه ادامه داشته باشد، درمان را قطع کرده و مجدداً جهت تشخیص دقیق‌تر اقدام شود.

موارد منع مصرف و احتیاطات

در طی دوره درمان، شیر گاوهای مربوطه جهت مصرف انسانی ارسال نشود. در گاوهایی که دوا بر در روز شیردوشی می‌شوند، شیر آنها تا ۷۲ ساعت پس از آخرین درمان (یعنی ۶ بار دوشش) ناپیستی مورد مصرف انسانی واقع شوند. در هر برنامه شیردوشی این دوره پرهیز از مصرف ۷۲ ساعت بایستی لحاظ گردد (مثلاً در گاوهایی که سه بار در روز شیردوشی می‌شوند، شیر این گاوها پس از نهمین دوشش برای مصرف در انسان مجاز خواهد بود). در طی دوره درمان، گاوهای مزبور ناپیستی به کشتارگاه فرستاده شوند. گاوهای تحت درمان را تنها پس از گذشت ۷ روز از آخرین مرحله درمان می‌توان به کشتارگاه ارسال کرد.

گاوهای طی دوره درمان باید تحت نظارت دامپزشک قرار