

# تایزرژن ۲۰۰

محلول تزریقی

# Tisergen 200

Injectable solution



## ترکیب:

هر میلی لیتر حاوی ۲۰۰ میلی گرم تایلوزین می باشد.

## احتیاطات:

در حیوانات حساس به تایلوزین یا سایر ماقرولیدها مصرف نشود.

در حیوانات دارای نارسایی کلیوی یا کبدی مصرف نشود.

در اسب مصرف نشود زیرا ممکن است کشنده باشد.

در صورت احتمال بروز مقاومت متقطع با سایر ماقرولیدها یا MSL ها مصرف نشود.

همراه با فلورفینیکل، لینکوامیدها و سایر ماقرولیدها مصرف نشود (به علت رقابت در اتصال به تحت واحد ۵۰s ریبوzوم).

با استرپتوماسین، هیدروکورتیزون سولفونامید یا تتراسیکلین ها مخلوط نشود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

## دوره پرهیز از مصرف:

گوشت و احشاء: ۱۴ روز

شیر: در حیوانات شیری در دوره تولید شیر برای مصرف انسان، تزریق نشود.

## بسته‌بندی:

ویال ۵۰ میلی لیتری

## سازنده:

شرکت داروسازی رویان دارو تحت لیسانس کمپانی MAYMO اسپانیا

## خواص فارماکولوژیک:

تایلوزین یک آنتی باکتریوال باکتریواستاتیک در مقادیر متداول مصرف و باکتریسید در مقادیر بالاتر مصرف است که به خانواده ماقرولیدها تعلق دارد. این دارو با انتشار به درون باکتری ها مانع از پروتئین های باکتری شده و به تحت واحد ۵۰s ریبوzومی می چسبد. تایلوزین علیه انواعی از باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوپلاسمها موثر است.

## موارد مصرف و حیوان هدف:

گاو، گوسفند، بز

برای درمان عفونت های ناشی از احرام حساس به تایلوزین شامل:

عفونت های تنفسی ناشی از پاستورالا مولتوسیدا، مانهیمیا همولیتیکا و آرکانوباکتریوم پیوژن، دیفتیری ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم، نکروباسیلوز بین انگشتی ناشی از فوزوباکتریوم پیوژن و رومپستان و متیت ناشی از آرکانوباکتریوم پیوژن.

## مقدار و روش مصرف:

تزریق عمیق عضلانی یا تزریق زیرپوستی

گاو، گوسفند، بز: ۱-۰/۵ میلی لیتر به ازای هر ۱۵ کیلوگرم وزن بدن هر ۲۴ ساعت به مدت ۵

روز در گاو در هر موضع نباید بیش از ۱۰ میلی لیتر

تزریق نمود و تزریقات بیش از آن باید در موضع دیگری انجام شود.