

تایلوزین
Tylosin 20%

و ورم پستان ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی.

گوسفند: آگالاکسی مسری و حاد ناشی از مایکوپلاسما
آگالاکتیه، ذات الاریه و ورم پستان

بز: پلورونیومونی واگیر بزان ناشی از مایکوپلاسما
میکوبیدس واریته کاپری.

مقدار و نحوه مصرف:

گاو و گوساله: روزانه ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حداکثر به مدت ۵ روز به صورت تزریق داخل عضلانی.

گوسفند و بز: روزانه ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حداکثر به مدت ۵ روز به صورت تزریق داخل عضلانی.

زمان پرهیز از مصرف:

گاو: شیر: ۷۲ ساعت، گوشت: ۷ روز

گوسفند: شیر: ۴۸ ساعت، گوشت: ۳ روز

موارد احتیاط:

صرف این دارو در حیوانات حساس به تایلوزین مجاز نمی باشد. استفاده از این دارو در اسب به علت برخورد اسهال های کشنده مطلقاً منوع است. تایلوزین تزریقی را فقط باید از راه تزریق عضلانی به کار برد. از تماس این دارو با پوست جلوگیری شود. بیش از ۱۰ میلی لیتر در یک ناحیه تزریق نشود. چنانچه در طی مدت ۳ تا ۵ روز پس از صرف دارو بهبودی حاصل نشد، می باشد در تشخیص بیماری و نوع درمان تجدید نظر نمود. درد و التهاب ناشی از تزریق در موضع و در مواردی اختلالات گوارشی خفیف مانند اسهال و بی اشتیاهی گزارش شده است.

شرایط نگهداری:

در دمای زیر ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

بسته بندی:

پیال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

تربیت:

هر میلی لیتر حاوی ۲۰۰ میلی گرم تایلوزین می باشد.

مکانیسم اثر:

تایلوزین آنتی بیوتیکی است از گروه ماکرولیدها که از نظر ساختمنی شبیه اریتروماسیسین می باشد. این آنتی بیوتیک از فعالیت قارچی بنام استریتوماسیس fradida حاصل می شود.

تایلوزین یک آنتی بیوتیک باکتریوستاتیک می باشد و مکانیسم عمل آن به خوبی شناخته نشده است. این آنتی بیوتیک به واحد S-۵ ریبوزوم متصل شده و مانع سنتز پروتئین باکتری می شود.

تایلوزین پس از تزریق به سرعت جذب می شود. انتشار این دارو در بدن به خوبی انجام می شود. تایلوزین به مانع مغزی - نخاعی نفوذ نمی کند. ۸ ساعت بعد از تزریق غلظت تایلوزین موجود در شیر تقریباً ۴ برابر غلظت آن در خون می باشد. میزان تایلوزین موجود در بافت ریه نیز چندین برابر مقدار موجود در سرم می باشد. دفع تایلوزین از طریق صفرا و ادرار انجام می شود.

موارد مصرف:

تایلوزین برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت مانند استافیلوکوک ها، استریتوکوک ها، کورینه باکتریوم ها و برقی ازمیکروب های گرم منفی (به جز کلی فرم ها)، اسپیروکت ها، کلامیدیاها و به خصوص مایکوپلاسما ها مورداستفاده قرار می گیرد. به طور کلی این دارو چهت درمان بیماری های زیر کاربرد دارد:

گاو و گوساله: ذات الاریه، پنوموآنتریت، دیفتری گوساله ها

پلورونیومونی واگیر، آرتربیت، گندیدگی سه، عفونت رحم