

تایلوزین فسفات ۲۵٪ رویان®

Tylosin phosphate 25%
ROOYAN



پیش مخلوط
Premix

ROOYAN
DAROU

تایلوزین



میزان ۴ کیلوگرم از تایلوزین فسفات ۲۵٪ در هر تن خوراک، در ۵ روز اول زندگی و تکرار مصرف به مدت ۲ روز در ۳-۵ هفتگی توصیه می‌شود.

زمان پرهیز از مصرف:

پنج روز قبل از کشتار

داخل دارویی:

از مصرف تایلوزین فسفات همزمان با سایر آنتی بیوتیک های مخلوط با دان اجتناب گردد.

موارد احتیاط:

در هنگام حمل و کاربرد دارو از لباس محافظه، دستکش و ماسک ضد غبار استفاده شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، دور از نور مستقیم و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت ۱ و ۵ کیلوگرمی

تزریق:

هر کیلوگرم تایلوزین فسفات ۲۵٪ حاوی ۲۵۰ گرم تایلوزین فعال است.

مکانیسم اثر:

تایلوزین آنتی بیوتیکی از دسته ماکرولیدهاست که از تحریر نوعی قارچ به دست می‌آید. این آنتی بیوتیک با جلوگیری از سنتر پروتئین ها توسط ریبوزوم ها باعث وقفه در رشد و نابودی باکتری ها می‌گردد. مکانیسم خاص تاثیر ماکرولیدها ضمن جلوگیری از رشد سریع میکروorganism ها از ایجاد مقاومت باکتریایی نیز ممانعت می‌کند.

موارد مصرف:

تایلوزین فسفات فقط در مصارف دامپزشکی کاربرد دارد و عمدها بر باکتری های گرم مثبت موثر است ولی بر روی اسپیروکت ها و انواعی از باکتری های گرم منفی (غیر از کلی فرم ها) نیز تاثیر دارد. تایلوزین فسفات در کنترل بیماری تنفسی مزمن (CRD) در پولت های جایگزین تخم گذار و نیمچه های گوشتشی، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی در نیمچه های گوشتشی و افزایش میزان تخم گذاری در مرغ های تخم گذار کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف:

نیمچه های گوشتشی و پولت های جایگزین تخم گذار: برای درمان بیماری تنفسی مزمن (CRD) ناشی از مایکوبلاسمای کالی سپتیکوم به