



دوسته و نوچه

- میش: ۵ میلی لیتر
- گوساله: ۱۰ میلی لیتر
- گاو: ۳۰ میلی لیتر
- فواصل تزریق هر ۲-۴ هفته یکبار
- تزریق این دارو به صورت زیرجلدی و با عضلانی می باشد.

تربیک:

هر میلی لیتر حاوی ۵۰ میلی گرم ویتامین E و ۰/۵ میلی گرم سلنیم به صورت سدیم سلنیت می باشد.

مکانیسم اثر:

ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدان با متوقف ساختن روند تشکیل رادیکال های آزاد و هیپرپروکسیدها موجب محافظت و جلوگیری از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشایع می شود. همچنین این ویتامین در سنتر ATP و متابولیسم انرژی و قدرت باروری و اینمی بدن تاثیر دارد. سلنیم نیز خواص آنتی اکسیدانی داشته و با شرکت در ترکیب آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز موجب حذف پراکسیدها و در نتیجه کاهش تشکیل رادیکال های آزاد می شود. این ویتامین پس از تزریق به سرعت جذب شده و از طریق دستگاه گردش خون در بافت های بدن ذخیره می گردد که بیشترین آن در بافت کبد می باشد. دفع این ویتامین همانند سایر ویتامین های محلول در چربی به آهستگی صورت می پذیرد.

موارد احتیاط:

از مصرف این دارو در انسان اکیداً خودداری شود و در صورت وقوع سریعاً به مراکز درمانی مراجعه گردد. احتمال بروز واکنش های آنافیلاکتیک بخصوص در تزریق داخل وریدی در اسب وجود دارد. مصرف بیش از اندازه سبب بروز مسمومیت می گردد. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در دمای بین ۱۵ - ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.
از بخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:
ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی لیتری

موارد مصرف:

درمان علایم ناشی از کمبود ویتامین E و سلنیم از جمله دیستروفی عضلانی (بیماری ماهیچه سفید)، کاهش مقاومت به عوامل عفونی و نارسایی های تولید مثلی مانند عدم باروری و جفت ماندگی اشاره نمود.

مقدار و نحوه مصرف:

- برو: ۱-۲ میلی لیتر