

لینکومایسین ۸۸٪  
Lincomycin 0.88%



لینکومایسین ۸۸٪  
Lincomycin 0.88%



آنچه  
باید  
داند

**موارد احتیاط:**  
در هنگام حمل و نقل و کاربرد دارو از ماسک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمائید. پس از حمل و نقل و کاربرد پریمیکس لینکومایسین، دست ها و صورت را با آب فراوان بشویید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
صرف لینکومایسین در اسب، نشخوارکنندگان، خرگوش و خوکچه هندی باعث ایجاد ناراحتی های شدید گوارشی می گردد.

لینکومایسین بر روی فلور روده ای تاثیر منفی ندارد.

#### شرابیت نگهداری:

در جای خشک، دور از نور مستقیم و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

**بسته بندی:**  
پاکت ۵ کیلوگرمی



پیش مخلوط  
Premix

ROOYAN  
DAROU

zoetis

تهییه شده از مواد اولیه شرکت

#### ترکیب:

هر کیلوگرم پریمیکس لینکومایسین محتوی ۸/۸ گرم لینکومایسین (ملح هیدروکلراید) می باشد.

#### موارد مصرف:

جهت کنترل ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفربننس، کمک به رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در نیمچه های گوشتی و کنترل CRD

#### مقادیر و نحوه مصرف:

جهت ورم روده نکروتیک، کنترل CRD و بهبود میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی با دوز ۵۰۰ گرم در هر تن خوارک از هفته اول پرورش جوجه های گوشتی تا انتهای دوره

#### زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

#### تداخل دارویی:

صرف هم زمان با اریترومایسین، تایلوزین و نووپیوسین توصیه نمی شود.  
این محصول با کلیه کوکسیدیواستات ها و محرک های رشد سازگار می باشد.