

LAR-VAC

واکسن زنده لیوفیلیزه علیه لارنگوتراکثیت عفونی

مشخصات:

LAR-VAC از کشت یک سویه تخفیف حدت یافته ویروس لارنگوتراکثیت عفونی بر روی بافت کبدی جنین جوچه تخم مرغ های SPF تهیه می شود که نهایتاً به شکل لیوفیلیزه در آمده است.

ایمنی بعد از ۱۰ الی ۱۵ روز پس از دریافت واکسن ایجاد می شود، البته چند روز پس از انجام واکسیناسیون طیور به طور نسبی با استفاده از پدیده اینترفرانس حفاظت نسبی در برابر بیماری دارند.

ترکیب:

هر دوز واکسن حاوی حداقل $10^{3.2}TCID_{50}$

موارد کاربرد:

پیشگیری از بروز بیماری لارنگوتراکثیت عفونی

میزان و نحوه مصرف:

محتویات ویال واکسن را در حلال حل نمایید. با استفاده از یک قطره چکان مناسب، یک قطره از واکسن داخل بینی یا چشم پرنده چکانده شود. LAR-VAC می تواند در پرندگان سالم با سن بالای ۲۱ روز مورد استفاده قرار گیرد.

نیمچه گوشتی:

اولین دوز واکسن در سن ۲۱ تا ۲۸ روزگی
دومین دوز واکسن در سن ۴۰ روزگی
مادر و تخم گذار:

اولین دوز واکسن در سن ۴ تا ۶ هفتگی
دومین دوز واکسن قبل از شروع تخمگذاری (سن ۱۵ الی ۲۰ هفتگی)

تذکر:

پس از استفاده ویال های خالی واکسن بایستی ضدعفونی شده یا سوزانده شوند.

شرایط نگهداری:


در درجه حرارت ۲ تا ۸ درجه سلسیوس نگهداری شود.

عمر قفسه ای:

۱۸ ماه

بسته بندی:

ویال های ۱۰۰۰ دوزی به همراه حلال



واردکننده: شرکت داروسازی رویان دارو
تلفن: ۴-۴۳۳۳۷۴۳۳-۸۸۹۳۰ فاکس: ۸۸۸۹۶۵۹۵
www.rooyandarou.com

