



100, 250, 500 ml,  
1, 2, 5 & 10 Liter  
Oral Suspension

فقط برای مصرف دامپزشکی

# Dimethicone 10%

سوسپانسیون خوراکی

## دایمتیکون ۱۰٪



### دایمتیکون ۱۰٪ (سوسپانسیون خوراکی)

#### ترکیب:

هر میلی لیتر از امولسیون حاوی ۱۰۰ میلی گرم سایمتیکون می باشد.

#### مکانیسم اثر:

دایمتیکون یک پلیمر متیل سیلیکون می باشد که از طریق کاهش کشش سطحی در داخل شکمبه، کف را از بین برده و از تشکیل آن نیز جلوگیری می کند.

#### حیوان هدف:

گاو، گوسفند و بز

#### موارد مصرف:

بعلت دارا بودن اثر ضد کفی، بهترین درمان برای نفخ کفی و گازی در گاو و نشخوارکنندگان کوچک است.

#### مقدار و نحوه مصرف:

۳۰ تا ۶۰ میلی لیتر از دارو را با ۱۰۰ میلی لیتر آب رقیق کنید؛ تجویز خوراکی با درنچ و یا لوله معده ای، تزریق مستقیم به داخل شکمبه از طریق یک سوزن بزرگ، کانولا و یا تروکار

گاو: ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلی لیتر از محلول رقیق شده

گوسفند و بز: ۳۵ تا ۷۵ میلی لیتر از محلول رقیق شده

#### موارد احتیاط:

در صورت مصرف صحیح، این دارو هیچگونه عوارض جانبی ندارد.

در صورتیکه تیوب معدی بطور ناگهانی وارد نای شود، سبب پنومونی تنفسی می شود.

عدم احتیاط در تجویز مستقیم دایمتیکون با سوزن و تروکار، باعث پخش محتویات شکمبه در داخل شکم گردیده و موجب تورم پرده صفاق می شود.

تزریق مستقیم داخل شکمبه باید در قسمت بالا چپ و در محدوده ستون فقرات و آخرین دنده (نقطه تهیگاه) انجام پذیرد.

#### زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

#### موارد منع مصرف:

ندارد.

#### شرایط نگهداری:

محصول در جای خنک و دور از نور مستقیم خورشید در دمای کمتر از ۲۵ درجه سلسیوس نگهداری شود.

#### بسته بندی:

ظروف ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ میلی لیتری، ۱، ۲، ۵ و ۱۰ لیتری