

Syva-Bax

Injectable Suspension

واکسن سیوا بکس

سوسپانسیون تزریقی

ولی در سایر بیماری های اشاره شده ایمنی بعد از ۳ هفته ایجاد می شود.

میزان و نحوه تزریق:

قبل از مصرف ویال واکسن را به خوبی تکان دهید.

گاو: ۵ میلی لیتر بصورت زیر پوستی

گوسفند و بز: ۲ میلی لیتر بصورت زیر پوستی

موارد احتیاط:

فقط در حیوانات سالم تزریق شود.

شرایط معمول بهداشتی در حین تزریق رعایت گردد.

در موارد تزریق اتفاقی به خود بلافاصله همراه با بروشور محصول به پزشک مراجعه شود.

فقط برای مصرف دامپزشکی

تنها با نسخه دامپزشک تجویز گردد.

عوارض جانبی:

واکنش های ازدیاد حساسیت می تواند بعد از تزریق واکسن رخ دهد. در چنین مواردی درمان با آنتی هیستامین و کورتیکواستروئید ها توصیه می شود. در صورت بروز علائم جدی و سایر مواردی که در اینجا ذکر نشده است حتماً دامپزشک را در جریان قرار دهید.

تداخل با سایر محصولات دامپزشکی:

اطلاعاتی در مورد ایمنی و اثر بخشی این واکسن هنگامی که با سایر محصولات دامپزشکی استفاده می شود در دست نمی باشد.

تصمیم در مورد استفاده از این واکسن قبل یا بعد از استفاده از هرگونه محصول دامپزشکی نیاز به بررسی موردی دارد.

مصرف بیش از اندازه:

در آزمایشات بی خطری، تزریق بیش از ۲ برابر دوز توصیه شده هیچ علائم سویی نشان نداده است.

ناسازگاری ها:

با سایر محصولات ایمونولوژیکی دامپزشکی مخلوط نشود.

موارد احتیاط ویژه برای محصولات استفاده نشده یا زباله های ایجاد شده:

محصول باز شده استفاده نشده و یا باقی مانده واکسن را از طریق جوشاندن، دفن کردن یا غوطه ور سازی در ماده ضدعفونی مناسب تایید شده توسط مراجع قانونی از بین ببرید.

شرایط ویژه نگهداری:

در دمای یخچال (۲ تا ۴ درجه سلسیوس) نگهداری و حمل و نقل شود.

دور از نور نگهداری شود.

در جعبه اصلی نگهداری شود.

از یخ زدگی جلوگیری شود.

بسته بندی:

ویال های ۱۰۰ و ۲۵۰ میلی لیتری

شرکت تولید کننده: سیوا - اسپانیا

ترکیب در هر دوز ۲ یا ۵ میلی لیتری:

α toxoid of Cl. Perfringens type A ≥ 0.3 I.U.*

β toxoid of Cl. perfringens types B and C ≥ 10 I.U.*

ϵ toxoid of Cl. perfringens types B and D ≥ 5 I.U.*

α toxoid of Cl. septicum ≥ 2.5 I.U.*

α toxoid of Cl. novyi type B ≥ 3.5 I.U.*

Cl. tetani toxoid ≥ 2.5 I.U.*

Cl. sordellii toxoid 100 % protection**

Cl. chauvoei concentrate 100 % protection**

* واحد بین المللی. مقدار موثر برای ایجاد سطوح آنتی بادی های خنثی کننده

در هر میلی لیتر از سرم خرگوش نشان داده شده در فارماکوپه اروپا

** سطح محافظت کننده در خوکچه هندی (مطابق با فارماکوپه اروپا)

ادجوانت:

هیدروکسید آلومینیوم ۵/۱۸ میلی گرم در دوز ۲ میلی لیتری

هیدروکسید آلومینیوم ۱۲/۹۵ میلی گرم در دوز ۵ میلی لیتری

حیوان هدف:

گاو، گوسفند و بز

موارد استفاده:

ایجاد ایمنی فعال در گاو، گوسفند و بز علیه بیماری های زیر:

- بیماری انتروتوکسمی و Yellow lamb disease ناشی از کلستریدیوم

پرفرینجنس تیپ A در بره ها و گوساله های جوان

- بیماری انتريت خونریزی دهنده بره ها ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ

B در بره ها و گوساله های جوان

- بیماری تورم روده نکروتیک و بیماری Struck ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس

تیپ C در گوسفندان بالغ و گوساله ها

- بیماری انتروتوکسمی یا قلهه نرمی (Pulpy kidney) ناشی از کلستریدیوم

پرفرینجنس تیپ D در همه سنین در هنگام تغییر جیره

- بیماری Braxy و ادم بدخیم ناشی از کلستریدیوم سپتیکوم

- بیماری هپاتیت نکروز دهنده عفونی یا قانقاریای کبدی (Black Disease)

ناشی از کلستریدیوم نوویی تیپ B

- بیماری شاربن علامتی ناشی از کلستریدیوم شوه ای

- بیماری گزاز ناشی از کلستریدیوم تتانی

- انتروتوکسمی ناشی از کلستریدیوم سوردلی

برنامه واکسیناسیون:

گوساله، بره و بزغاله:

اولین واکسیناسیون در دو نوبت به فاصله ۴ هفته انجام می شود. توصیه می شود

در نوزادان متولد شده از مادران واکسینه نشده اولین دوز واکسن در هفته

دوم تولد (دوز دوم در ۶ هفتگی) تزریق شود و در نوزادان متولد شده از مادران

واکسینه اولین دوز تزریق در هفته ۱۲ (دوز دوم در ۱۶ هفتگی) انجام شود.

واکسن یادآور: هر ۶ ماه یک بار

بالغین:

اولین واکسیناسیون دو نوبت به فاصله ۴ هفته

واکسن یادآور: هر ۶ ماه یک بار

در هنگام آبستنی:

دو دوز از واکسن به ترتیب در ۸ هفته و ۴ هفته قبل از زمان پیش بینی شده

برای زایمان، تزریق شود.

ایجاد ایمنی فعال در مادران آبستن، انتقال ایمنی غیر فعال به دام های جوان

در ۳ ماه اول زندگی را تضمین می کند.

انتقال ایمنی غیر فعال از مادران واکسینه شده با خوردن میزان مناسب آغوز

در ساعات اولیه بعد از تولد بدست می آید.

ایمنی علیه انتروتوکسمی ناشی از کلستریدیوم سوردلی و شاربن علامتی ناشی

از کلستریدیوم شوه ای دو هفته بعد از تزریق دومین دوز واکسن ایجاد می شود.



laboratorios syva s.a. (Spain)

شرکت داروسازی رویان دارو

تلفن: ۰۳۰۰۰۰۵۷۸

www.rooyandarou.com

