

# نوار کنه کش واروستاپ®

علیه کنه واروا در زنبور عسل

Varostop®



PRIMAVET-SOFIA Ltd.

BULGARIA

تولیدکننده: شرکت پریماوت-صوفیه، بلغارستان

نماینده اتحماری در ایران:

شرکت داروسازی رویان دارو

تلفن: ۰۷۸۰ ۳۰۰۰

[www.rooyandarou.com](http://www.rooyandarou.com)

ROOYAN  
DAROU  
PHARMACEUTICAL COMPANY

**دوز مصرف:**

- دوز مصرف بستگی به قدرت کلنی زنبور عسل دارد.
- کندوهای جوان و کمتر آسیب دیده با کنه واروا: ۲ نوار
- کندوهای نرمال و درگیر شده با کنه واروا: ۴ نوار
- نوارها باید حداقل به مدت ۵ هفته و نهایتاً ۶ هفته درون کندو باقی بمانند.
- برای تشخیص میزان درگیری با کنه واروا باید در کف کندو کاغذی سفید پهن شود و یک نوار را به مدت ۲۴ ساعت درون کندو قرار دهیم و پس از ۲۴ ساعت تعداد کنه های روی کاغذ شمارش شود.

**موارد منع مصرف:**

در هنگام برداشت عسل استفاده نشود.

**زمان پرهیز از مصرف:**

ندارد.

**حیوان هدف:**

زنبور عسل

**ترکیبات:**

هر نوار حاوی ۳/۳ میلی گرم فلومترین می باشد.

**مکانیسم اثر:**

پایروتروئید مصنوعی (فلومترین) موجود در نوارهای وارو استاپ یکی از موثرترین کنه کش های شیمیایی بر علیه بیماری ایجاد شده با کنه واروا و مایت می باشد. این ماده دارای خاصیت کنه کشی بسیار بالایی می باشد. (بالاتر از ۹۸/۶%). این ماده سیستم عصبی کنه ها را فلچ نموده و جمعیت آنها را به شدت کاهش می دهد. فلومترین روی کنه واروا بصورت کاملاً انتخابی اثر نموده و هیچگونه اثر منفی به روی زنبورهای عسل ندارد. تاکنون هیچگونه شواهدی دال بر مقاوم شدن کنه واروا به فلومترین گزارش نشده است.

**موارد مصرف:**

تشخیص، پیشگیری و درمان درگیری با کنه واروا

**روش مصرف:**

نوارها در وسط قاب ها و جایی که تخم ریزی انجام می شود، نصب شود.

**بهترین زمان مصرف:**

- در ابتدای بهار، هنگامیکه تخم ریزی در حال شروع می باشد و تعداد تخم ها زیاد نیست.
- در تابستان، پس از برداشت عسل، هنگامیکه تخم ریزی به حداقل رسیده و بیشتر کنه ها روی بدن زنبورها می باشند.
- در پاییز و هنگامیکه تخم ریزی ملکه به حداقل رسیده است.

**نماینده انحصاری در ایران:**

شرکت داروسازی رویان دارو