



20 kg
Premix

فقط برای مصرف دامپزشکی

TOX OFF PLUS®

پیش مخلوط

Bentonite: 70% + Yeast cell wall: 30%

توكس آف پلاس® بنتونیت و دیواره سلولی مخمر

طیور و نشخوارکنندگان: ۲ کیلوگرم در هر تن دان
آبزیان پرورشی: ۳ کیلوگرم در هر تن خوراک

دوره منع مصرف: ندارد.



موارد احتیاط:
در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکش های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می شود.
در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.
از تماس محصول با پوست اکیداً خودداری نمایید.
بعد از اتمام کار در کیسه را محکم ببندید.

توكس آف پلاس® (توكسين بايندر چند جزئی)

تركیبات:
هر کیلو حاوی ۷۰٪ بنتونیت + ۳۰٪ دیواره سلولی مخمر می باشد.
موارد هدف:
دام، طیور و آبزیان

شرایط نگهداری:
در جای خشک، زیر ۳۰ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم
نگهداری شود.

موارد کاربرد:
بنتونیت و دیواره مخمر رویان دارای قابلیت بالای جذب سموم مختلف خانواده آکلاتوکسین و سایر مایکوتوكسین ها از طریق آکلوتیناسیون می باشد. سموم آگلوتینه شده همراه با جاذب از طریق مدفوع دفع می گردد. این محصول به طور ویژه برای غذای حیوانات ساخته شده تا بتواند از آنها در برابر تاثیرات منفی طیف وسیعی از مایکوتوكسین ها محافظت کند.

مقدار و نحوه مصرف:
پیشگیری از مسمومیت با سموم قارچی:
طیور و نشخوارکنندگان: ۱/۵ تا ۱ کیلوگرم در هر تن دان
آبزیان پرورشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در هر تن خوراک
در موارد آلودگی بالا: