



20 kg
Premix

فقط برای مصرف دامپزشکی

TOX OFF®

پیش مخلوط

Bentonite

توكس آف®

موارد خطر بالای آسودگی:
طیور: ۲ کیلوگرم در هر تن دان
نشخوارکنندگان: ۵۰-۲۵ گرم به ازای هر راس دام در روز
آبزیان پرورشی: ۲ کیلوگرم در هر تن خوراک

دوره منع مصرف: ندارد.



موارد احتیاط:
در هنگام مخلوط کردن و کاربرد دارو از لباس و دستکش های محافظ و ماسک ضدغبار استفاده نمایید چون باعث تحریک و ایجاد حساسیت شدید در چشم می شود.
در صورت ورود تصادفی دارو به چشم سریعاً محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید.
از تماس محصول با پوست اکیداً خودداری نمایید.
بعد از اتمام کار در کیسه را محکم ببندید.

شرایط نگهداری:
بنتونیت یا آلومینیوم سیلیکات از جذب مایکروتوكسین های مهم از دستگاه گوارش جلوگیری می کند و در نتیجه مانع ایجاد علائم گوارشی و مشکلات ناشی از آن نظیر اختلالات تولید مثل آسودگی شیر با آفلاتوکسین M1 و سرکوب سیستم ایمنی می گردد و می تواند به عنوان یک توكسین بایندر مطمئن و یک پلت بایندر فوق العاده مورد استفاده قرار گیرد.

بسته بندی:
پاکت ۲۰ کیلوگرمی

توكس آف® (توكسین بایندر)
ترکیبات:
هر کیلو حاوی ۱۰۰۰ گرم بنتونیت می باشد.

حیوان هدف:
طیور، دام و آبزیان

موارد کاربرد:

بنتونیت یا آلومینیوم سیلیکات از جذب مایکروتوكسین های مهم از دستگاه گوارش جلوگیری می کند و در نتیجه مانع ایجاد علائم گوارشی و مشکلات ناشی از آن نظیر اختلالات تولید مثل آسودگی شیر با آفلاتوکسین M1 و سرکوب سیستم ایمنی می گردد و می تواند به عنوان یک توكسین بایندر مطمئن و یک پلت بایندر فوق العاده مورد استفاده قرار گیرد.

مقدار و نحوه مصرف:
پیشگیری از مسمومیت با سموم قارچی:

طیور: ۱ کیلوگرم در هر تن دان
نشخوارکنندگان: ۲۵-۱۰ گرم به ازای هر راس دام در روز
آبزیان پرورشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر تن خوراک